

This Page Is Inserted by IFW Operations
and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

**As rescanning documents *will not* correct images,
please do not report the images to the
Image Problem Mailbox.**



BREVET D'INVENTION

- ②① N° du procès verbal de dépôt 157.628 - Paris.
②② Date de dépôt 3 juillet 1968, à 13 h 17 mn.
Date de l'arrêté de délivrance 11 août 1969.
④⑥ Date de publication de l'abrégé descriptif au
Bulletin Officiel de la Propriété Industrielle. 19 septembre 1969 (n° 38).
⑤① Classification internationale C 07 d//A 61 k.

⑤④ Nucléosides de C-alcoyl-purine et pyrimidine.

⑦② Invention :

⑦① Déposant : Société dite : MERCK & CO., INC., résidant aux États-Unis d'Amérique.


Mandataire : Regimbeau, Corre & Paillet.

③① Priorité conventionnelle :

③② ③③ ③① - Brevet déposé aux États-Unis d'Amérique le 3 juillet 1967, n° 650.610
au nom de Edward Walton.

La présente invention concerne de nouveaux nucléosides de sucre à chaîne ramifiée. Plus particulièrement, il concerne des ribofuranose nucléosides de purine et pyrimidine qui ont un groupe alcoyle en position 2'-C ou 3'-C dans le cycle de la portion sucre. Ainsi, les nouveaux composés selon l'invention ont une ramification unique et non pas au point de fixation d'une chaîne latérale. L'invention concerne aussi les 2-C-alcoyl- et 3-C-alcoyl ribofuranoses intermédiaires nouveaux utilisés dans la préparation des nucléosides de sucre et leurs procédés de préparation.

Les nouveaux nucléosides de sucres à chaîne ramifiée sont les α - et/ou β -anomères des nucléosides représentés par les formules (A) et (B) et les nouveaux intermédiaires par la formule (C) :



dans lesquelles :

- J et K, identiques ou différents, peuvent représenter de l'hydrogène ou des groupes alcoyle inférieur, halogéno, mercapto, alcoyl inférieur-mercapto, amino ou amino substitué par un alcoyle inférieur, sous réserve que, lorsque J est un groupe amino et K un groupe hydroxy, la portion ribofuranoyl peut être fixée en position 7 de la purine ;
- L et M, identiques ou différents, peuvent être des groupes alcoxy, hydroxy, amino ou amino substitué par un alcoyle, et, en outre, M peut aussi être de l'hydrogène, un radical alcoyle, un halogène ou un radical alcoyle substitué par un ou plusieurs


la formule (C) précédente.

Des composés typiques sont le chlorure de 2,3,5-tri-O-acétyl-2-C-méthyl-D-ribofuranosyle, le chlorure de 2,3,5-tri-O-propionyl-2-C-méthyl-D-ribofuranosyle, le chlorure de 2,3,5-tri-O-butyryl-2-méthyl-D-ribofuranosyle, le chlorure de 2,3,5-tri-O-benzoyl-2-C-méthyl-D-ribofuranosyle, le chlorure de 2,3,5-tri-O-toluyyl-2-C-méthyl-D-ribofuranosyle, le chlorure de 2,3,5-tri-O-xyloyl-2-C-méthyl-D-ribofuranosyle, le chlorure de 2,3,5-tri-O-méthoxybenzoyl-2-C-méthyl-D-ribofuranosyle, le chlorure de 2,3,5-tri-O-chlorobenzoyl-2-C-méthyl-D-ribofuranosyle, le chlorure de 2,3,5-tri-O-p.nitrobenzoyl-2-C-méthyl-D-ribofuranosyle, le chlorure de 2,3,5-tri-O-benzoyl-2-C-n-éthyl-D-ribofuranosyle, le chlorure de 2,3,5-tri-O-benzoyl-2-C-n-propyl-D-ribofuranosyle, le chlorure de 2,3,5-tri-O-benzoyl-2-C-n-butyl-D-ribofuranosyle, le chlorure de 2,3,5-tri-O-benzoyl-3-C-méthyl-D-ribofuranosyle, le chlorure de 2,3,5-tri-O-benzoyl-3-C-éthyl-D-ribofuranosyle, le bromure de 2,3,5-tri-O-acétyl-2-C-méthyl-D-ribofuranosyle, le bromure de 2,3,5-tri-O-benzoyl-2-C-méthyl-D-ribofuranosyle, le bromure de 2,3,5-tri-O-p.nitrobenzoyl-2-C-méthyl-D-ribofuranosyle, le bromure de 2,3,5-tri-O-benzoyl-2-C-éthyl-D-ribofuranosyle, le bromure de 2,3,5-tri-O-benzoyl-3-C-méthyl-D-ribofuranosyle, et le bromure de 2,3,5-tri-O-benzoyl-3-C-éthyl-D-ribofuranosyle.

Le schéma I illustre la préparation des halogénures de 2,3,5-tri-O-acyl-2-C-méthyl-D-ribofuranosyle intermédiaires à partir de la 2-C-méthyl-D-ribo- γ -lactone qui est un produit connu (E. Peligot, Compt. rend. 89, 918, 1879).

Schéma I

Préparation des halogénures de 2-méthylribofuranosyle intermédiaires



Dans ce schéma :

R' , R'' et R''' sont des groupes acyle choisis parmi les groupes alcanoyles inférieurs, benzoyle et benzoyle substitués; et

R est un radical alcoyle inférieur, ou un groupe acyle tel que défini précédemment.

Dans l'opération A de ce procédé, la 2-C-méthyl-D-ribo- γ -lactone est transformée en son dérivé 2,3,5-tri-O-acylé (II). Ce dernier composé est alors réduit avec un dialcyl borane dans l'opération B pour produire comme produit principal un mélange anomère de 2,3,5-tri-O-acyl-2-C-méthyl-D-rib furan se (III), en même temps qu'un mélange anomère de 3,5-di-O-acyl-2-C-méthyl-D-ribofuranose.

Si l'on essaie de séparer les α et β -anomères de III par chromatographie sur alumine lavé à l'aide ou sur gel de silice, il se produit une transposition qui donne le 1,3,5-tri-O-acyl-2-O-méthyl- α -D-ribofuranose (VI). Dans l'opération C, l'acylation du mélange d'anomères du 2,3,5-tri-O-acyl- (ou 3,5-di-O-acyl)-2-C-méthyl-D-ribofuranose (III), le 3,5-di-O-acyl-2-C-méthyl-D-ribofuranose, ou du produit transposé, 1,3,5-tri-O-acyl-2-C-méthyl- α -D-ribofuranose (VI) conduit à un 1,2,3,5-tétra-O-acyl-2-C-méthyl- $\alpha(\beta)$ -D-ribofuranose (IV).

Dans l'opération D, le ribofuranose (IV) est transformé en halogénure de ribofuranosyle (V) par une réaction d'halogénéation dans un solvant approprié. Bien que les anomères de (IV) puissent être séparés, le même sucre halogéné (V) est obtenu généralement à partir de l'anomère α ou β de (IV) ou d'un mélange des deux anomères.

Dans les opérations A et C, les agents acylants qu'on emploie de préférence sont les halogénures et les anhydrides d'acides contenant le radical acyle approprié. Ainsi, on peut employer les halogénures d'alcanoyl, de benzoyl et de benzoyl substitué ou l'anhydride d'acide approprié. Des exemples sont le chlorure d'acétyl, le bromure d'acétyl, le chlorure de propionyl, l'anhydride acétique, l'anhydride propionique, l'anhydride butyrique, le bromure de benzoyl, le chlorure de benzoyl, le chlorure de teluoyl, le bromure de p-méthoxybenzoyl, le bromure de p-nitrobenzoyl et le chlorure de p-nitrobenzoyl. Les procédés préférés sont la benzoxylation au chlorure de benzoyl, ou l'acétylation à l'anhydride acétique. On effectue de préférence l'acylation en présence d'un solvant et, quand la réaction comporte la mise en liberté d'un acide halogéné, on emploie en général un solvant basique, par exemple des solvants tels que la pyridine, la N,N-diéthylaniline et la triéthylamine. Toutefois, d'autres véhicules tels que l'eau et le benzène peuvent être utilisés conjointement avec des bases organiques ou minérales et donnent de bons résultats. La température n'est pas critique pour l'acylation des groupes hydroxyle en 3 (secondaire) ou 2 (primaire); toutefois, il faut une température élevée pour l'acylation de l'hydroxyle tertiaire en 2. On peut opérer entre 15°C et 100°C.

Quand la réaction est terminée, les produits sont extraits de préférence par un solvant sélectif comme un éther, un ester ou un solvant aliphatique chloré: chloroforme, chlorure d'éthylène et analogues. L'extrait peut alors être concentré pour donner le produit final acylé. Les alcanoyl, benzoyl et benzoyl substitué-ribofurannes préparés dans ces opérations sont des composés nouveaux.

Dans l'opération B, le groupe carbonyle en position 1 est réduit en groupe hydroxyle, de préférence avec un dialcyl borane, par exemple 1 bis(3-méthyl-2-butyl)-borane ou 1 di(isoamyl sec.)-borane.

Il est avantageux de dissoudre la lactone dans un solvant anhydre à 0°C environ et d'ajouter peu à peu l'agent réducteur en plusieurs heures à 0°C-25°C. D'autres agents réducteurs qui peuvent être utilisés sont le borohydrure de sodium ou l'amalgame de sodium. On peut employer aussi
5 la réduction électrolytique.

La réduction de la 2,3,5-tri-O-acyl-2-C-méthyl-D-ribono- - lactone (II) avec le bis(3-méthyl-2-butyl)-borane donne le 2,3,5-tri-O-acyl-2-C-méthyl- α (et β)-D-ribofuranose (III) comme produit principal. On obtient aussi du 3,5-di-O-acyl-2-C-méthyl- α (et β)-D-ribofuranose.
10 La séparation des anomères α et β du 2,3,5-tri-O-benzoyl-2-C-méthyl-D-ribofuranose sur alumine lavée à l'acide produit une transposition presque complète en 1,3,5-tri-O-benzoyl-2-C-méthyl- α -D-ribofuranose (VI). La même transposition se produit, mais dans une moindre mesure, au cours de la chromatographie des produits de réduction sur gel de
15 silice. Le produit transposé peut être utilisé pour mettre d'autres groupes acyle en position 2.

Dans l'opération D du procédé, le 1,2,3,5-tétra-O-acyl-2-C-méthyl-D-ribofuranose obtenu dans l'opération C est traité dans des conditions anhydres pour introduire un atome d'halogène sur le carbone
20 1 du composé, en utilisant un agent qui donne un anion halogène en présence d'un acide fort. De tels agents sont l'acide bromhydrique, l'acide chlorhydrique, le bromure de thionyle, le chlorure de thionyle et les halogénures métalliques, l'acide chlorhydrique et l'acide bromhydrique étant préférés. Dans le cas des halogénacides, ceux-ci
25 agissent à la fois comme source d'anion halogène et comme acide fort. La température n'est pas critique et on obtient de bons résultats en opérant entre 0°C et 25°C. Avec le β -anomère, la réaction est aisée et est complète au bout d'une période allant de 20 minutes à deux heures. La réaction est plus difficile avec l' α -anomère et peut demander
30 plusieurs jours. Quand la réaction est complète, on concentre les produits et on enlève l'excès de solvant sous pression réduite. Il est préférable d'utiliser des solvants inertes, mais l'emploi de solvants n'est pas critique. Des solvants qui conviennent sont les éthers, les esters, les hydrocarbures aromatiques comme le benzène, le toluène, le
35 xylène, les hydrocarbures chlorés et tout spécialement les acides aliphatiques inférieurs comme l'acide acétique.


Dans un mode de préparation préférentiel, le ribofuranose est traité par l'acide chlorhydrique (ou bromhydrique) en solution dans de l'éther ou de l'acide acétique contenant une petite quantité de chlorure
40 (ou bromure) d'acétyle. La réaction de l' α -anomère avec l'halogénacide évolue lentement et peut n'être pas complète, alors que la réaction du β -anomère avec l'halogénacide se déroule rapidement. Dans le cas de l' α -anomère, il est préférable de préparer l'halogénure en deux

temps, d'abord avec une solution de l'halogénacide dans l'acide acétique, puis, après élimination du réactif, avec l'halogénacide dans l'éther.

Le schéma II illustre la préparation des halogénures de 2,3,5-tri-O-acyl-2-alcyl inférieur-D-ribofuranosyl intermédiaires à partir d'un halogénure de 2,3,5-tri-O-acyl-D-ribofuranosyle.

Schéma II

Préparation d'halogénures de 2-C-alcyl-D-ribofuranosyle intermédiaires



Dans ce schéma :

R', R'' et R''' sont des groupes acyle choisis parmi les groupes alcanoy-
le inférieurs, benzoyle et benzoyle substitués et
R et Y sont chacun un radical alcoyle inférieur.

5 Dans l'opération A de ce procédé, un halogémure de 2,3,5-
tri-O-acyl-D-ribofuranosyle (VII), dans lequel le groupe acyle est un
alcanoyle inférieur, un benzoyle ou un benzoyle substitué par un ou
plusieurs radicaux alcoyle inférieurs, alcoxy inférieurs ou des groupes
halo ou nitro, est transformé en 1,3,5-tri-O-acyl- α -D-ribofuranose (VIII)
10 par addition d'une solution aqueuse d'acétone à l'halogénose, et repos
du mélange pendant une heure à une température d'environ 5° à 50°C.
La vitesse de réaction croît avec la température. On utilise de préfé-
rence une solution d'environ 4 à 6 parties (en volume) d'eau dans
l'acétone, bien que la concentration ne soit pas critique. Une plus
15 grande quantité d'eau tendra à hydrolyser aussi le groupe halogène en
position 1, ce qui donne un mélange défavorable de produits. Le produit
est facilement isolé par des procédés connus de l'homme de métier.

Dans l'opération B, le 1,3,5-tri-O-acyl- α -D-ribofuranose
(VIII) est traité par HCl et un alcanol inférieur pour donner l'alcoyl
20 3,5-di-O-acyl- α -(et β)-D-ribofuranoside (IX). La réaction se produit à
une température de 5° à 50°C, de préférence à 25°C. D'autres acides
minéraux comme HBr ou l'acide sulfurique peuvent aussi être employés.
Bien que le méthanol soit préféré, d'autres alcanols inférieurs peu-
vent être utilisés. Les α et β -anomères sont séparés par chromato-
25 graphie sur gel de silice.

L'alcoyl 3,5-di-O-acyl- α -D-ribofuranoside (IX) est alors
oxydé en alcoyl- 3,5-di-O-acyl- α -D-érythro-pentofuran-2-uloside (X)
dans l'opération C. Des agents oxydants convenables sont le tétra-
oxyde de ruthénium, le trioxyde de chrome dans la pyridine ou le
30 diméthylsulfoxyde dans l'acide ou l'anhydride acétique. Si on utilise
le tétra-oxyde de ruthénium, la réaction se produit à la température
ordinaire, bien qu'on puisse utiliser des températures comprises entre
5° et 50°C.

Dans l'opération D, l'alcoyl 3,5-di-O-acyl- α -D-érythro-
35 pentofuran-2-uloside (X) est mis à réagir avec un réactif de Grignard
en proportions essentiellement stoechiométriques à une température
allant de 5° à 80°C environ, pendant une durée pouvant aller de quelques
minutes à plusieurs heures, ce qui donne naissance à un 3,5-di-O-acyl-
2-C-alcoyl inférieur- α -D-ribofuranoside (XI). Des exemples de réactifs
40 de Grignard pouvant être utilisés dans cette réaction sont le bromure
de méthyl magnésium, le chlorure d'éthyl magnésium, l'iodure de propyl
magnésium et analogues.

L'alcoyl 3,5-di-O-acyl-2-C-alcoyl inférieur- α -D-ribofuranoside

(XI) est transformé par acylation en alcoyl 2,3,5-tri-O-acyl-C-alcoyl inférieur- α -D-ribofuranosid (XII) dans l'opération E à une température élevée. Des températures de l'ordre de 40° à 100°C environ conviennent bien, quand on utilise comme agent acylant un halogénure d'acide ou un anhydride d'acide en présence d'une base organique comme la pyridine, la diméthylaniline, la N-méthylmorpholine ou analogue, ou d'une base minérale comme l'acétate de sodium dans un solvant comme le benzène, le dioxane ou le tétrahydrofurane.


Le méthyl 2,3,5-tri-O-benzoyl-2-C-alcoyl inférieur- α -D-riboside (XII) est transformé en halo sucre (XII) dans l'opération F par une réaction de remplacement d'halogène en utilisant l'halogène-acide désiré dans de l'acide acétique. Cette réaction de remplacement se produit à une température de 5° à 30°C environ et dure de 5 à 24 heures environ.

Le schéma III illustre la préparation des halogénures de 2,3,5-tri-O-acyl-3-alcoyl inférieur-D-ribofuranosyle intermédiaires à partir d'un 1,2-O-isopropylidène-5-O-acyl- α -D-érythro-pentafuran-3-ulose.

Schéma III

Préparation d'halogénures de 3-alcoyl inférieur-D-ribofuranosyle intermédiaires


Opération A




Les composés intermédiaires XV, qui sont des produits nouveaux sont alors traités dans l'opération B par l'une des méthodes B_a ou B_b.

Opération B

Méthode B_a



Méthode B_b



Dans ce qui précède :

R et Z sont des radicaux alcoyle inférieurs ;
 R' , R'' et R''' sont chacun de l'hydrogène ou un résidu acyle choisi parmi
 les groupes alcanoyles inférieurs, benzyl et benzoyle substi-

tués, et

X_a est un halogène ou un groupe hydroxy et
 X_b est un radical acyle défini comme précédemment.

On prépare les composés intermédiaires du schéma III en
 5 faisant d'abord réagir un 5-O-acyl-1,2-O-isopropylidène-D-érythro-
 pentofuran-3-ulose (XIV) avec un réactif de Grignard, pour obtenir un
 5-O-acyl-1,2-isopropylidène-3-alcoyl inférieur-D-ribofuranose (XV). Ce
 dernier composé est alors traité selon l'une ou l'autre des deux
 méthodes pour obtenir les composés nouveaux de l'invention. Dans la
 10 première méthode, le 5-O-acyl-1,2-O-isopropylidène-3-alcoyl inférieur-
 D-ribofuranose (XV) est soumis à une alcoolyse acide pour produire un
 alcoyl 5-O-acyl-3-alcoyl inférieur-D-ribofuranoside qui est acylé et
 donne l'alcoyl 2,3,5-tri-O-acyl-3-alcoyl inférieur-D-ribofuranoside
 (XVI). Ce ribofuranoside peut être alors transformé en le sucre libre
 15 en employant une solvolysse basique suivie d'une hydrolyse par un acide
 fort en milieu aqueux, ou bien il peut être transformé en l'halogénose
 par une réaction de remplacement d'halogène dans un solvant approprié.
 Dans la seconde méthode, le 5-O-acyl-1,2-O-isopropylidène-3-alcoyl
 inférieur-D-ribofuranose (XVI) est acylé dans des conditions basiques
 20 pour former le 3,5-di-O-acyl-1,2-O-isopropylidène-3-alcoyl inférieur-
 D-ribofuranose (XIX), qui est alors hydrolysé dans un acide fort, puis
 acylé dans un solvant approprié pour donner les composés (XX) de l'in-
 vention dans lesquels X, R', R'' et R''' sont des groupes acyle.

Plus particulièrement, on obtient les halogénures de 3-C-
 25 alcoyl inférieur-ribofuranosyle selon l'invention en faisant réagir un
 5-O-acyl-1,2-O-isopropylidène-D-érythro-pentafuran-3-ulose avec un
 réactif de Grignard en proportions essentiellement stoechiométriques à
 une température allant de 5°C à 80°C environ pendant un temps pouvant
 aller de quelques minutes à 5 heures; on forme ainsi un 5-O-acyl-1,2-
 30 O-isopropylidène-3-C-alcoyl inférieur-D-ribofuranose. Les réactifs de
 Grignard utilisés dans cette réaction sont des halogénures d'alcoyl
 magnésium inférieurs. Des exemples de ces réactifs sont le bromure de
 méthyl magnésium, le bromure d'éthyl magnésium, le chlorure de méthyl-
 magnésium, le chlorure d'éthyl magnésium, l'iode de méthyl magnésium,
 35 l'iode d'éthyl magnésium et le bromure de propyl magnésium.

Selon un mode de réalisation de l'invention, on utilise la
 méthode B_a et on obtient les composés (XVIII), dans lesquels X est un
 groupe hydroxy ou un halogène. Dans cette méthode, le 5-O-acyl-1,2-O-
 isopropylidène-3-O-alcoyl inférieur-D-ribofuranose est soumis à une
 40 alcoolyse par réaction avec un acide fort comme l'acide chlorhydrique,
 l'acide bromhydrique ou l'acide sulfurique et un alcool inférieur dans
 un intervalle de température allant de 5°C à 60°C environ pendant une
 durée de quelques minutes à 5 heures environ, et on obtient un alcoyl

- 5-0-acyl-3-C-alcyl inférieur-D-ribofuranoside. Ce dernier composé est acylé dans des conditions basiques avec des agents acylants comme un halogénure ou un anhydride d'acide. Des exemples de ces agents acylants sont le chlorure de benzoyle, le bromure de benzoyle, le chlorure de p.-nitrobenzoyle, l'anhydride acétique et l'anhydride propionique. Cette acétylation est effectuée entre 20°C et 100°C environ, pendant un temps de 2 à 72 heures et on obtient l'alcoyl 2,3,5-tri-0-acyl-3-C-alcoyl inférieur-D-ribofuranoside. Le ribofuranoside peut alors être transformé en le sucre libre par une solvolysé basique, c'est-à-dire par traitement avec un alcanol inférieur à une température comprise entre 15°C et 60°C environ, puis par hydrolyse avec un acide fort comme l'acide chlorhydrique, l'acide bromhydrique ou l'acide sulfurique en milieu aqueux. Cette opération d'hydrolyse acide est conduite à une température de 5°C à 50°C environ pendant 2 à 24 heures. En variante, le ribofuranoside peut être transformé en l'halo sucre par une réaction de remplacement d'halogène en utilisant l'halogénacide désiré dans un solvant approprié tel que l'acide acétique, le chlorure de méthylène, le tétrachloréthane, ou l'acide propionique. Cette réaction de remplacement est conduite à une température de 5°C à 30°C environ.
- Selon un autre aspect de l'invention on utilise la méthode B_p et on obtient des composés (XX) dans lesquels il y a un groupe acyle en position 1. Dans cette méthode, le 5-0-acyl-1,2-0-isopropylidène-3-alcoyl inférieur-D-ribofuranose est acylé entre 20°C et 100°C environ pendant 12 à 72 heures dans des conditions basiques, ce qui donne un 3,5-di-0-acyl-1,2-0-isopropylidène-3-alcoyl inférieur-D-ribofuranose. L'agent acylant peut être un halogénure ou un anhydride d'acide comme le chlorure de benzoyle, le bromure de benzoyle, le chlorure de p.-nitrobenzoyle, l'anhydride acétique ou l'anhydride propionique. La condition basique est assurée par une base comme la pyridine, la diméthylaniline, la N-méthylmorpholine ou l'acétate de sodium dans un solvant inerte comme le benzène, le dioxane ou le tétrahydrofurane. Le 3,5-di-0-acyl-1,2-0-isopropylidène-3-alcoyl inférieur-D-ribofuranose est alors hydrolysé dans un acide fort comme l'acide chlorhydrique, l'acide bromhydrique ou l'acide sulfurique puis acylé avec un anhydride comme l'anhydride acétique, propionique ou butyrique, pour donner les composés (XX) selon l'invention. Cette réaction d'hydrolyse-acylation est effectuée entre 5°C et 50°C environ pendant environ 2 à 20 heures. Toutes les réactions sont faites dans des proportions essentiellement stoechiométriques. L'alcoyl 2,3,5-tri-0-acyl-2(ou 3)-alcoyl inférieur-D-ribofuranoside est transformé en le 2(ou 3)-C-alcoyl inférieur-D-ribofuranose correspondant par traitement avec de l'hydroxyde de baryum dans un alcanol inférieur, de préférence du méthanol, pour éliminer le groupement acyle, puis par hydrolyse acide pour couper l'alcoyle

glycosidique.


Les nouveaux nucléosides de purine contenant une chaîne ramifiée dans la portion sucre sont les isomères α et β des nucléosides représentés par la formule (A) :

5

10

15

20



dans laquelle :

J et K, identiques ou différents, peuvent être de l'hydrogène, des radicaux alcoyle inférieurs, des halogènes, des groupes mercapto, alcoylmercapto inférieur, amino ou alcoyl(inférieur)amino, sous réserve que, lorsque H est un groupe amino et K est un hydroxy, la portion ribofuranoyl peut aussi être rattachée à la purine en position 7; et

25

Y et Z sont chacun un radical alcoyle inférieur ou de l'hydrogène, sous réserve que, quand Y est un radical alcoyle inférieur, Z est de l'hydrogène et quand Y est de l'hydrogène, Z représente un radical alcoyle inférieur.

30

Les composés sont généralement appelés 2-K-6-J-9-(2 ou 3)-alcoyl inférieur-D-ribofuranosyl)purines, bien qu'il faille considérer comme compris dans l'invention l'isomère 7 de composés ayant la structure (A) lorsque J est un groupe hydroxy et que K est un groupe amino.

35

Des exemples des nouveaux nucléosides de purine selon l'invention sont les suivants, qui sont donnés à titre non limitatif :

9-(2-C-méthyl-D-ribofuranosyl)purine

9-(2-C-méthyl-D-ribofuranosyl)-2-méthylpurine

40

9-(2-C-méthyl-D-ribofuranosyl)-6-méthylpurine

9-(2-C-méthyl-D-ribofuranosyl)-2,6-diméthylpurine


9-(2-C-méthyl-D-ribofuranosyl)-2-éthylpurine

9-(2-C-méthyl-D-ribofuranosyl)-6-éthylpurine

- 9-(2-C-méthyl-D-ribofuranosyl)-2,6-diéthylpurin
9-(2-C-méthyl-D-ribofuranosyl)-2-aminopurine
9-(2-C-méthyl-D-ribofuranosyl)-6-aminopurine
9-(2-C-méthyl-D-ribofuranosyl)-2,6-diaminopurine
5 9-(2-C-méthyl-D-ribofuranosyl)-2-méthylaminopurine
9-(2-C-méthyl-D-ribofuranosyl)-6-méthylaminopurine
9-(2-C-méthyl-D-ribofuranosyl)-2,6-diméthylaminopurine
9-(2-C-méthyl-D-ribofuranosyl)-6-éthylaminopurine
9-(2-C-méthyl-D-ribofuranosyl)-2-hydroxypurine
10 9-(2-C-méthyl-D-ribofuranosyl)-6-hydroxypurine
9-(2-C-méthyl-D-ribofuranosyl)-2-méthyl-6-aminopurine
9-(2-C-méthyl-D-ribofuranosyl)-2-méthylamino-6-méthylpurine
9-(2-C-méthyl-D-ribofuranosyl)-2-méthyl-6-hydroxypurine
9-(2-C-méthyl-D-ribofuranosyl)-2-hydroxy-6-méthylpurine
15 9-(2-C-méthyl-D-ribofuranosyl)-2-amino-6-hydroxypurine
9-(2-C-méthyl-D-ribofuranosyl)-2-hydroxy-6-aminopurine
9-(2-C-méthyl-D-ribofuranosyl)-2-méthylamino-6-hydroxypurine
9-(2-C-méthyl-D-ribofuranosyl)-2-diméthylaminopurine
9-(2-C-méthyl-D-ribofuranosyl)-6-diméthylaminopurine
20 9-(2-C-méthyl-D-ribofuranosyl)-2-mercaptopurine
9-(2-C-méthyl-D-ribofuranosyl)-6-mercaptopurine
9-(2-C-méthyl-D-ribofuranosyl)-6-méthylmercaptopurine
9-(2-C-méthyl-D-ribofuranosyl)-2,6-dimercaptopurine
9-(2-C-méthyl-D-ribofuranosyl)-2-méthyl-6-mercaptopurine
25 9-(2-C-méthyl-D-ribofuranosyl)-2,6-dichloropurine
9-(2-C-méthyl-D-ribofuranosyl)-2-chloropurine
9-(2-C-méthyl-D-ribofuranosyl)-2-bromopurine
9-(2-C-méthyl-D-ribofuranosyl)-6-bromopurine
9-(2-C-méthyl-D-ribofuranosyl)-6-chloropurine
30 9-(2-C-méthyl-D-ribofuranosyl)-2,6-dibromopurine
9-(2-C-méthyl-D-ribofuranosyl)-6-amino-2-fluoropurine
9-(2-C-méthyl-D-ribofuranosyl)-6-amino-2-chloropurine
9-(2-C-éthyl-D-ribofuranosyl)-2-méthylpurine
9-(2-C-éthyl-D-ribofuranosyl)-6-aminopurine
35 9-(2-C-éthyl-D-ribofuranosyl)-2,6-diaminopurine
9-(2-C-éthyl-D-ribofuranosyl)-6-méthylaminopurine
9-(2-C-éthyl-D-ribofuranosyl)-2,6-diméthylaminopurine
9-(2-C-éthyl-D-ribofuranosyl)-6-éthylaminopurine
9-(2-C-éthyl-D-ribofuranosyl)-2-amino-6-hydroxypurine
40 9-(2-C-éthyl-D-ribofuranosyl)-6-mercaptopurine
9-(2-C-éthyl-D-ribofuranosyl)-2-méthyl-6-mercaptopurine
9-(2-C-éthyl-D-ribofuranosyl)-6-chloropurine
9-(2-C-éthyl-D-ribofuranosyl)-6-amino-2-fluoropurine


- 9-(3-C-méthyl-D-rib furanosyl)-6-méthylpurine
 9-(3-C-méthyl-D-ribofuranosyl)-6-aminopurine
 9-(3-C-méthyl-D-ribofuranosyl)-2,6-diaminopurine
 9-(3-C-méthyl-D-ribofuranosyl)-6-méthylaminopurine
 5 9-(3-C-méthyl-D-ribofuranosyl)-2,6-diméthylaminopurine
 9-(3-C-méthyl-D-ribofuranosyl)-6-éthylaminopurine
 9-(3-C-méthyl-D-ribofuranosyl)-2-amino-6-hydroxypurine
 9-(3-C-méthyl-D-ribofuranosyl)-6-mercaptopurine
 9-(3-C-méthyl-D-ribofuranosyl)-2-méthyl-6-mercaptopurine
 10 9-(3-C-méthyl-D-ribofuranosyl)-6-chloropurine
 9-(3-C-méthyl-D-ribofuranosyl)-6-amino-2-fluoropurine
 9-(3-C-éthyl-D-ribofuranosyl)-6-méthylpurine
 9-(3-C-éthyl-D-ribofuranosyl)-6-aminopurine
 9-(3-C-éthyl-D-ribofuranosyl)-2,6-diaminopurine
 15 9-(3-C-éthyl-D-ribofuranosyl)-6-méthylaminopurine
 9-(3-C-éthyl-D-ribofuranosyl)-2,6-diméthylaminopurine
 9-(3-C-éthyl-D-ribofuranosyl)-6-éthylaminopurine
 9-(3-C-éthyl-D-ribofuranosyl)-2-amino-6-hydroxypurine
 9-(3-C-éthyl-D-ribofuranosyl)-6-mercaptopurine
 20 9-(3-C-éthyl-D-ribofuranosyl)-2-méthyl-6-mercaptopurine
 9-(3-C-éthyl-D-ribofuranosyl)-6-chloropurine
 9-(3-C-éthyl-D-ribofuranosyl)-6-amino-2-fluoropurine.

D'une façon générale, on prépare les nucléosides de purine substitués en 2-, 6- ou 2,6- contenant une chaîne ramifiée en position
 25 2' ou 3' de la portion sucre, en faisant réagir un halogénure de
 2,3,5-tri-O-acyl-D-ribofuranosyle de formule



dans laquelle :

- 35 R', R'' et R''', identiques ou différents, sont des groupes acyle choisis
 parmi les groupes alcanoyle inférieurs, benzoyle et benzoyle
 substitués, et
 Y et Z sont de l'hydrogène ou des radicaux alcoyle inférieurs, mais Y
 est un radical alcoyle inférieur quand Z est de l'hydrogène et
 Z est un radical alcoyle inférieur quand Y est de l'hydrogène,
 40 avec une chloromercuri purine substituée en 2,6 de formule



5

dans laquelle

10 J et K, identiques ou différents, sont de l'hydrogène, ou des groupes alcoyle inférieurs, des halogènes, des groupes acylamino inférieurs ou acylamino substitués par des radicaux alcoyle inférieurs.

La réaction se fait en proportions essentiellement stoechiométriques, à une température d'environ 25°C à environ 150°C, et de
15 préférence entre 100°C et 140°C. Dans cette opération, on effectue la réaction dans un solvant approprié. Le choix du solvant n'a pas d'importance pourvu qu'il soit inerte et qu'il ait un point d'ébullition compris entre 25°C et 150°C environ. Des exemples de tels solvants sont le benzène, le dibutyléther, le cyclohexane, le toluène, le xylène et
20 analogues; on emploie de préférence le toluène et le xylène. La réaction est normalement complète entre 15 minutes et 5 heures environ selon la température de réaction. Après avoir obtenu le produit de réaction intermédiaire, les produits sont traités comme indiqué plus loin pour obtenir les substituants désirés en 2 et 6 dans la portion
25 purine du nucléoside.

Dans le cas de la solvolysé, par exemple, pour transformer un groupe 6-benzamido en un groupe 6-amino, la réaction est effectuée en présence d'un catalyseur basique dans un solvant approprié à une
30 température allant de 5°C environ à 150°C environ, de préférence de 65°C à 90°C environ pendant un temps pouvant aller de 15 minutes environ à 5 heures environ. La durée de la réaction dépend de la température, du catalyseur et du solvant utilisés. Des exemples de catalyseurs basiques sont les bases alcalines et alcalino-terreuses et leurs alcoxydes correspondants, des solutions d'ammoniaque, des amines et des
35 amines substituées. Des exemples de solvants sont les alcools inférieurs, le solvant préféré étant le méthanol. Dans ce traitement, les groupements bloquant les groupes acyle seront aussi éliminés.

Dans le cas d'aminolyse, par exemple pour transformer un substituant 6-halo en un substituant 6-amino, la réaction est effectuée
40 en présence d'ammoniac ou d'une monoalcoyl- ou d'une dialcoylamine entre 25°C environ et 150°C environ, et de préférence entre 85°C environ et 110°C environ pendant 15 minutes environ à 5 heures environ. Des exemples d'amines sont la méthylamine, la diméthylamine, l'éthylamine,

la diéthylamine, la propylamine et la dipropylamine. Les réactions avec l'ammoniaque ou avec une amine à bas point d'ébullition comme la méthylamine sont effectuées en récipient scellé pour empêcher toute perte du réactif volatil aux températures indiquées. Dans ce traitement, les groupements bloquant les acyle seront aussi éliminés.


Dans le cas de mercaptolyse, par exemple d'un substituant 6-halo, la réaction est effectuée en présence de thio-urée ou d'un sel métallique d'un alcoylmercaptan à une température allant de 25°C environ à 150°C environ, de préférence de 65°C environ à 90°C environ pendant 15 minutes environ à 5 heures environ. Des exemples de sels alcalins ou alcalino-terreux d'alcoyl mercaptans sont les sels de sodium du méthylmercaptan, de l'éthylmercaptan et de l'isopropylmercaptan, le sel de potassium du méthylmercaptan et le sel de calcium du méthylmercaptan.

Lorsque le réactif de mercaptolyse est la thio-urée, les groupes qui bloquent les acyle ne sont pas éliminés dans les portions R', R'' et R''' et le composé intermédiaire résultant doit être soumis à une solvolysé basique pour donner les composés mercapto de l'invention.

Le composé dans lequel K et L sont de l'hydrogène est obtenu à partir de la 9-(2,3,5-tri-O-acyl-2- β - ou 3- β -alcoyl inférieur-alcoyl-D-ribofuranosyl)-6-halopurine en présence d'un catalyseur au palladium à une température pouvant aller de la température ordinaire à 80°C environ. La température n'est pas critique, bien qu'on opère de préférence à température légèrement élevée. L'hydrogénation est effectuée en présence d'un solvant inerte comme le méthanol, l'éthanol, le dioxane et analogue. Un tel traitement enlève un atome de chlore ou de brome en position 6. Les groupes acyle R', R'' et R''' présents dans les positions 2, 3 et 5 sont alors éliminés, par exemple par traitement avec une solution d'alcoxyde alcalin, comme décrit précédemment.

Les 2' (ou 3')-alcoyl inférieur-ribofuranosyl nucléosides ayant les substituants 2-fluoro-6-amino dans le noyau de la purine sont préparés par diazotation à partir de la 9-(2- β - ou 3- β -O-alcoyl inférieur-D-ribofuranosyl)-2,6-diaminopurine.

Les nouveaux nucléosides de 2(1H)-pyrimidinone contenant une chaîne ramifiée dans la portion sucre sont représentés par les formules de structure suivantes (B) :



15 dans lesquelles :

L et M, identiques ou différents, sont des groupes alcoxy inférieurs, hydroxy, amino éventuellement substitués par des radicaux alcoyl inférieurs, et de plus M peut être aussi de l'hydrogène, un radical alcoyle inférieur, un halogène ou un groupe alcoyle inférieur halogéné, notamment trifluorométhyle; et

20 Y et Z sont chacun de l'hydrogène ou un radical alcoyl inférieur, Z étant un alcoyle inférieur lorsque Y est de l'hydrogène et Z étant de l'hydrogène lorsque Y est un radical alcoyle inférieur.

Des exemples des groupes L et M, qui peuvent être identiques

25 ou différents dans les composés selon l'invention, sont des radicaux alcoxy inférieurs comme méthoxy, éthoxy ou propoxy; hydroxy; amino ou amino substitué comme méthylamino, diméthylamino, éthylamino, diéthylamino, propylamino ou dipropylamino. De plus M peut aussi être de l'hydrogène; un radical alcoyle inférieur comme méthyle, éthyle ou

30 propyle; un halogène comme le chlore, le brome, l'iode ou le fluor ou un groupe alcoyle halogéné, notamment trifluorométhyle.

On citera, à titre non limitatif, comme représentants des composés obtenus par le procédé selon l'invention, les formes α et β des produits suivants :

- 35 1-(2/ou 3)-C-méthyl-D-ribofuranosyl)-4-méthoxy-2(1H)-pyrimidinone ;
 1-(2/ou 3)-C-méthyl-D-ribofuranosyl)-4-éthoxy-2(1H)-pyrimidinone ;
 1-(2/ou 3)-C-méthyl-D-ribofuranosyl)-4-propoxy-2(1H)-pyrimidinone ;
 1-(2/ou 3)-C-méthyl-D-ribofuranosyl)-4-hydroxy-5-chloro-2(1H)-pyrimidinone ;
- 40 1-(2/ou 3)-C-méthyl-D-ribofuranosyl)-4-amino-5-trifluorométhyl-2(1H)-pyrimidinone ;
 1-(2/ou 3)-C-méthyl-D-ribofuranosyl)-4-hydroxy-5-trifluorométhyl-2(1H)-pyrimidinone ;

- 1-(2/ou 3/ -C-méthyl-D-ribofuranosyl)-4-hydroxy-5-bromo-2(1H)-pyrimidinone ;
1-(2/ou 3/ -C-méthyl-D-ribofuranosyl)-4-hydroxy-5-iodo-2(1H)-pyrimidinone ;
5 1-(2/ou 3/ -C-méthyl-D-ribofuranosyl)-4-hydroxy-5-fluoro-2(1H)-pyrimidinone ;
1-(2/ou 3/ -C-méthyl-D-ribofuranosyl)-4-amino-2(1H)-pyrimidinone ;
1-(2/ou 3/ -C-méthyl-D-ribofuranosyl)-4-méthylamino-2(1H)-pyrimidinone ;
1-(2/ou 3/ -C-méthyl-D-ribofuranosyl)-4-diméthylamino-2(1H)-pyrimidinone ;
10 1-(2/ou 3/ -C-méthyl-D-ribofuranosyl)-4-diéthylamino-2(1H)-pyrimidinone ;
1-(2/ou 3/ -C-méthyl-D-ribofuranosyl)-4,5-diméthoxy-2(1H)-pyrimidinone ;
1-(2/ou 3/ -C-méthyl-D-ribofuranosyl)-4-méthoxy-5-chloro-2(1H)-pyrimidinone ;
15 1-(2/ou 3/ -C-méthyl-D-ribofuranosyl)-4-méthoxy-5-fluoro-2(1H)-pyrimidinone ;
1-(2/ou 3/ -C-méthyl-D-ribofuranosyl)-4-hydroxy-5-méthyl-2(1H)-pyrimidinone ;
20 1-(2/ou 3/ -C-méthyl-D-ribofuranosyl)-4-hydroxy-5-éthyl-2(1H)-pyrimidinone ;
1-(2/ou 3/ -C-méthyl-D-ribofuranosyl)-4-amino-5-méthyl-2(1H)-pyrimidinone ;
1-(2/ou 3/ -C-méthyl-D-ribofuranosyl)-4-amino-5-éthyl-2(1H)-pyrimidinone ;
25 1-(2/ou 3/ -C-méthyl-D-ribofuranosyl)-4-méthoxy-5-méthyl-2(1H)-pyrimidinone ;
1-(2/ou 3/ -C-méthyl-D-ribofuranosyl)-4-éthoxy-5-méthyl-2(1H)-pyrimidinone ;
30 1-(2/ou 3/ -C-méthyl-D-ribofuranosyl)-4-méthoxy-5-éthyl-2(1H)-pyrimidinone ;
1-(2/ou 3/ -C-méthyl-D-ribofuranosyl)-4-éthoxy-5-éthyl-2(1H)-pyrimidinone ;
1-(2/ou 3/ -C-méthyl-D-ribofuranosyl)-4-amino-5-bromo-2(1H)-pyrimidinone ;
35 1-(2/ou 3/ -C-méthyl-D-ribofuranosyl)-4-amino-5-fluoro-2(1H)-pyrimidinone ;
1-(2/ou 3/ -C-méthyl-D-ribofuranosyl)-4-hydroxy-5-amino-2(1H)-pyrimidinone ;
40 1-(2/ou 3/ -C-méthyl-D-ribofuranosyl)-4-hydroxy-5-méthylamino-2(1H)-pyrimidinone ;
1-(2/ou 3/ -C-méthyl-D-ribofuranosyl)-4-hydroxy-5-diméthylamino-2(1H)-pyrimidinone ;

- 1-(2/ou 3/7-C-éthyl-D-ribofuranosyl)-4-méthoxy-2(1H)-pyrimidinone ;
1-(2/ou 3/7-C-éthyl-D-ribofuranosyl)-4-éthoxy-2(1H)-pyrimidinone ;
1-(2/ou 3/7-C-éthyl-D-ribofuranosyl)-4-propoxy-2(1H)-pyrimidinone ;
1-(2/ou 3/7-C-éthyl-D-ribofuranosyl)-4-hydroxy-5-chloro-2(1H)-
5 pyrimidinone ;
1-(2/ou 3/7-C-éthyl-D-ribofuranosyl)-4-amino-5-trifluorométhyl-2(1H)-
pyrimidinone ;
1-(2/ou 3/7-C-éthyl-D-ribofuranosyl)-4-hydroxy-5-trifluorométhyl-2(1H)-
pyrimidinone ;
10 1-(2/ou 3/7-C-éthyl-D-ribofuranosyl)-4-hydroxy-5-bromo-2(1H)-
pyrimidinone ;
1-(2/ou 3/7-C-éthyl-D-ribofuranosyl)-4-hydroxy-5-iodo-2(1H)-
pyrimidinone ;
1-(2/ou 3/7-C-éthyl-D-ribofuranosyl)-4-hydroxy-5-fluoro-2(1H)-
15 pyrimidinone ;
1-(2/ou 3/7-C-éthyl-D-ribofuranosyl)-4-amino-2(1H)-pyrimidinone ;
1-(2/ou 3/7-C-éthyl-D-ribofuranosyl)-4-méthylamino-2(1H)-pyrimidinone ;
1-(2/ou 3/7-C-éthyl-D-ribofuranosyl)-4-diméthylamino-2(1H)-
pyrimidinone ;
20 1-(2/ou 3/7-C-éthyl-D-ribofuranosyl)-4-diéthylamino-2(1H)-pyrimidinone ;
1-(2/ou 3/7-C-éthyl-D-ribofuranosyl)-4,5-diméthoxy-2(1H)-pyrimidinone ;
1-(2/ou 3/7-C-éthyl-D-ribofuranosyl)-4-méthoxy-5-chloro-2(1H)-
pyrimidinone ;
1-(2/ou 3/7-C-éthyl-D-ribofuranosyl)-4-méthoxy-5-fluoro-2(1H)-
25 pyrimidinone ;
1-(2/ou 3/7-C-éthyl-D-ribofuranosyl)-4-hydroxy-5-méthyl-2(1H)-
pyrimidinone ;
1-(2/ou 3/7-C-éthyl-D-ribofuranosyl)-4-hydroxy-5-éthyl-2(1H)-
pyrimidinone ;
30 1-(2/ou 3/7-C-éthyl-D-ribofuranosyl)-4-amino-5-méthyl-2(1H)-
pyrimidinone ;
1-(2/ou 3/7-C-éthyl-D-ribofuranosyl)-4-amino-5-éthyl-2(1H)-
pyrimidinone ;
1-(2/ou 3/7-C-éthyl-D-ribofuranosyl)-4-méthoxy-5-méthyl-2(1H)-
35 pyrimidinone ;
1-(2/ou 3/7-C-éthyl-D-ribofuranosyl)-4-éthoxy-5-méthyl-2(1H)-
pyrimidinone ;
1-(2/ou 3/7-C-éthyl-D-ribofuranosyl)-4-méthoxy-5-éthyl-2(1H)-
pyrimidinone ;
40 1-(2/ou 3/7-C-éthyl-D-ribofuranosyl)-4-éthoxy-5-éthyl-2(1H)-
pyrimidinone ;
1-(2/ou 3/7-C-éthyl-D-ribofuranosyl)-4-amino-5-bromo-2(1H)-pyrimidinone ;
1-(2/ou 3/7-C-éthyl-D-ribofuranosyl)-4-amino-5-fluoro-2(1H)-pyrimidinone ;

1-(2[ou 3]-C-éthyl-D-ribofuranosyl)-4-hydroxy-5-amino-2(1H)-pyrimidinone ;


1-(2[ou 3]-C-éthyl-D-ribofuranosyl)-4-hydroxy-5-méthylamino-2(1H)-pyrimidinone ; et

5 1-(2[ou 3]-C-éthyl-D-ribofuranosyl)-4-hydroxy-5-diméthylamino-2(1H)-pyrimidinone.

Les deux anomères α et β des composés selon l'invention sont préparés par réaction d'une 2,4-dialcoxypyrimidine avec un halogénure de 2,3,5-tri-O-acyl-2(ou 3)-C-alcoyl inférieur-D-ribofuranosyl pour former une 1-(2,3,5-tri-O-acyl-2[ou 3]-C-alcoyl inférieur-D-ribofuranosyl)-4-alcoxy-2(1H)-pyrimidinone. On fait alors réagir ces composés intermédiaires avec de l'ammoniac ou une amine primaire ou secondaire pour produire des composés (XXIV) dans lesquels L est un groupe amino ou amino substitué.

15 Le produit de réaction de l'opération A peut aussi être hydrolysé dans des conditions acides ou basiques pour produire les composés (XXIV) dans lesquels L est un groupe hydroxy.

La réaction est illustrée par le schéma suivant :



dans lequel :

L et M sont définis comme précédemment ;

X est un halogène en configuration α ou β ou une combinaison des deux ;

5 V est un radical alcoyle inférieur ;

W est un groupe alcoxy inférieur et/ou hydroxy ; et

R', R'' et R''' sont des groupes acyle.

Comme exemples de groupes acyle on peut citer les radicaux alcanoyls comme acétyls, propionyls ou butyryls ; benzoyls et benzoyls substitués
10 par des groupes alcoyle ou alcoxy inférieurs, des halogènes ou des groupes nitro. Les solvants peuvent être des alcanols inférieurs.

Plus spécialement, le procédé selon l'invention comporte dans l'opération A la réaction d'un excès d'une 2,4-dialcoxypyrimidine avec un halogénure de 2,3,5-triacyl-2-(ou 3)-C-alcoyl inférieur-D-ribofuranosyl à une température de 5°C environ à 120°C environ, et de préférence entre 25°C environ et 60°C environ, jusqu'à fin de réaction. Dans
15 cette opération, la réaction est effectuée dans un solvant approprié. Le choix du solvant n'est pas très important du moment qu'il s'agit d'un solvant inerte. Des exemples de solvants sont le chlorure de méthylène, le benzène, le diéthyléther, le dibutyléther, le dioxane, le cyclohexane, le tétrahydrofurane et analogues. La réaction qui produit les anomères α et β (XIII) est normalement complète dans un temps allant de quelques heures à plusieurs jours, selon la température de réaction et la réactivité de l'halogénure.

25 Le produit de réaction obtenu dans l'opération A, lorsque W est un alcoxy inférieur, est alors amené à réagir avec de l'ammoniac ou une alcoylamine inférieure comme la méthylamine, l'éthylamine, la propylamine ou la diméthylamine dans l'opération B dans un solvant approprié à la même température que dans l'opération A ; on obtient un
30 composé XXIV dans lequel L est un amino éventuellement substitué par un radical alcoyle inférieur.

Les nouveaux nucléosides de 2(1H)-pyrimidinose peuvent aussi être obtenus par condensation de l'halo sucre avec un complexe de mercure d'une pyrimidine comportant les substituants appropriés.

35 Pour la préparation de quelques composés selon l'invention, un traitement ultérieur peut être nécessaire. Par exemple, les dérivés 5-halo sont obtenus en halogénant une 1-(2/ou 3)-alcoyl inférieur-D-ribofuranosyl)-4-hydroxy-2(1H)-pyrimidinone selon des méthodes connues pour halogéner la 1-(D-ribofuranosyl)-4-hydroxy-2(1H)-pyrimidinone. La
40 1-(2/ou 3)-alcoyl inférieur-D-ribofuranosyl)-5-halo-4-hydroxy-2(1H)-pyrimidinone obtenue est alors transformée en la 1-(2/ou 3)-alcoyl inférieur-D-ribofuranosyl)-4-hydroxy-5-amino-2(1H)-pyrimidinone correspondant par traitement avec de l'ammoniac ou une amine primaire ou

secondaire comm décrit précédemment. Par exemple, on obtient la 1-(2-C-méthyl)-D-ribofuranosyl-4-hydroxy-5-amino-2(1H)-pyrimidinone de préférence en bromant la 1-(2-méthyl)-D-ribofuranosyl-4-hydroxy-2(1H)-pyrimidinone, puis en faisant réagir avec l'ammoniac la 1-(2-méthyl)-D-ribofuranosyl-4-hydroxy-5-bromo-2(1H)-pyrimidinone obtenue.

Les exemples qui suivent illustrent les méthodes de mise en pratique de l'invention, mais il doit être bien entendu qu'ils ne sont nullement limitatifs.

Exemple 1 -

10 2,3,5-tri-O-benzoyl-2-C-méthyl-D-ribono- γ -lactone

Une solution de 5 g (30,8 mmoles) de 2-C-méthyl-D-ribono- γ -lactone dans 100 ml de pyridine sèche est refroidie, agitée et traitée avec 17 ml de chlorure de benzoyle. Le mélange est chauffé à 65-70°C pendant 4 heures puis refroidi et agité tandis qu'on ajoute 20 ml d'eau.

15 Après 25 minutes, le mélange est concentré jusqu'à consistance d'un semi-solide épais qu'on dissout dans 100 ml de chloroforme et lave avec trois portions de 50 ml d'acide chlorhydrique à 10 %, deux portions de 50 ml de bicarbonate de sodium 1 N et deux portions de 50 ml d'eau. La couche chloroformique séchée est concentrée et le résidu est
20 cristallisé dans l'éther. Le rendement en 2,3,5-tri-O-benzoyl-2-C-méthyl-D-ribono- γ -lactone est 10,8 g (74 %); P.F. 141-142°C; $[\alpha]_D^{20}$ -79° (c 1, chloroforme; λ_{max} 5,57 μ (lactone), 5,70 et 5,78 μ (ester):

En remplaçant dans le mode opératoire ci-dessus, le chlorure de benzoyle par 24 g de chlorure de p-nitrobenzoyle, on obtient la
25 2,3,5-tri-O-p-nitrobenzoyl-2-C-méthyl-D-ribono- γ -lactone.

En remplaçant le chlorure de benzoyle par 12 ml d'anhydride acétique, on obtient la 2,3,5-tri-O-acétyl-2-C-méthyl-D-ribono- γ -lactone.

30 Exemple 2 -

5-O-acétyl-3-O-benzoyl-2-O-p-nitrobenzoyl-D-ribono- γ -lactone

Une solution de 5 g (30,8 mmoles) de 2-C-méthyl-D-ribono- γ -lactone sèche dans 100 ml de pyridine sèche est agitée, refroidie à -20°C et traitée avec 2,42 g (30,8 mmoles) de chlorure d'acétyle.

35 Après 30 minutes le mélange est chauffé à 0°C et traité avec 4,3 g (30,8 mmoles) de chlorure de benzoyle. Après encore 90 minutes on ajoute 5,7 g (30,8 mmoles) de chlorure de p-nitrobenzoyle et on chauffe le mélange à 65-70°C pendant 4 heures. Le mélange est concentré sous pression réduite et le résidu semi-solide est dissous dans
40 200 ml de chloroforme et lavé à froid avec trois portions de 50 ml d'acide chlorhydrique à 10 %, deux portions de 50 ml de bicarbonate de sodium 1 N et deux portions de 50 ml d'eau. La couche chloroformique séchée est concentrée et donne un résidu constitué en majeure partie

par de la 5-O-acétyl-3-O-benzoyl-2-O-p.nitrobenzoyl-D-ribo- γ -lactone qui peut être purifiée par chromatographie sur gel de silice dans des mélanges de benzène et d'acétate d'éthyle.

Exemple 3 -

5 2,3,5-tri-O-benzoyl-2-C-méthyl- α (et β)-D-ribofuranose et
3,5-di-O-benzoyl-2-C-méthyl- α (et β)-D-ribofuranose

A une solution agitée de 30 g (63 mmoles) de 2,3,5-tri-O-benzoyl-2-C-méthyl-D-ribo- γ -lactone dans 125 ml de tétrahydrofurane sec on ajoute goutte à goutte sous atmosphère d'azote 175 ml de
 10 bis(3-méthyl-2-butyl)-borane 1 M. Après 16 heures à 25°C, la solution est refroidie à 0°C et additionnée avec précaution de 26 ml d'eau. Quand le dégagement de gaz a cessé, on chauffe le mélange à reflux pendant 30 minutes. On concentre le mélange et dissout l'huile résiduelle dans 250 ml d'acétone et 75 ml d'eau. La solution est refroidie
 15 (0° à 5°C) et agitée tandis qu'on ajoute goutte à goutte 33 ml d'eau oxygénée à 30 %, le pH étant maintenu entre 7 et 9 par addition d'hydroxyde de sodium 3N. On décompose l'excès d'eau oxygénée en ajoutant avec précaution 500 mg de platine à 5 % sur charbon. On sépare le catalyseur et extrait le filtrat avec 4 portions de 200 ml de chloroforme. La solution chloroformique est concentrée et donne 42 g d'une
 20 huile résiduelle. Une chromatographie en couche mince sur gel de silice dans un mélange de chloroforme et d'acétate d'éthyle (19:1) montre des zones (développées à la vapeur d'iode) à R_f 0,7 (sous produit), 0,5 (2,3,5-tri-O-benzoyl-2-C-méthyl- α (et β)-D-ribofuranose) et 0,4 (3,5-di-O-benzoyl-2-C-méthyl- α (et β)-D-ribofuranose, 0,2 et 0,1 (sous-
 25 produits).

Le résidu chromatographié sur une courte colonne de 650 g de gel de silice (100-200 mesh) dans un mélange de chloroforme et d'acétate d'éthyle (99:1). Les fractions contenant des produits de R_f (tlc)
 30 0,7, 0,5 et 0,4 sont concentrées en une huile (32 g). Une nouvelle chromatographie de l'huile sur 600 g de silice dans un mélange de benzène et d'acétate d'éthyle (19:1) donne 15 g d'un mélange de 2,3,5-tri-O-benzoyl-2-C-méthyl- α (et β)-D-ribofuranose et de 3,5-di-O-benzoyl-2-C-méthyl- α (et β)-D-ribofuranose.

35 Par une nouvelle chromatographie de ce mélange sur gel de silice dans un mélange de benzène et d'acétate d'éthyle (19:1), on obtient des fractions dont on isole le 2,3,5-tri-O-benzoyl-2-C-méthyl- α (et β)-D-ribofuranose. D'autres fractions donnent le 3,5-di-O-benzoyl-2-C-méthyl- α (et β)-D-ribofuranose pur.

40 La chromatographie des anomères α et β du 2,3,5-tri-O-benzoyl-2-C-méthyl-D-ribofuranose sur de l'alumine lavée à l'acide donne lieu à une transposition en 1,3,5-tri-O-benzoyl-2-C-méthyl- α -D-ribofuranose, $[\alpha]_D + 92^\circ$ (c 1, CHCl₃). La même transposition se produit, mais dans une moindre mesure, au cours de la chromatographie sur

gel de silice.

Si, dans le mode opératoire ci-dessus, on remplace la 2,3,5-tri-O-benzoyl-2-C-méthyl-D-ribo- γ -lactone par 38 g (63 mmoles) de 2,3,5-tri-O-p-nitrobenzoyl-2-C-méthyl-D-ribo- γ -lactone, on obtient le 2,3,5-tri-O-p-nitrobenzoyl-2-C-méthyl- α (et β)-D-ribofuranose.

En utilisant 18,3 g (63 mmoles) de 2,3,5-tri-O-acétyl-2-C-méthyl-D-ribo- γ -lactone, on obtient le 2,3,5-tri-O-acétyl-2-C-méthyl- α (et β)-D-ribofuranose.

Exemple 4 -

10 1,2,3,5-tétra-O-benzoyl-2-C-méthyl- α (et β)-D-ribofuranose

Un mélange de 15 g (32,2 mmoles) de 2,3,5-tri-O-benzoyl-2-C-méthyl- α (et β)-D-ribofuranose dans 250 ml de pyridine sèche est traité avec 15,2 ml de chlorure de benzoyle. On chauffe le mélange pendant 5 heures à 80°C, le refroidit au bain de glace, ajoute 10 ml d'eau et on agite pendant 30 minutes à 25°C pour décomposer le chlorure de benzoyle n'ayant pas réagi. La majeure partie de la pyridine est éliminée sous pression réduite et le résidu dans 350 ml de chloroforme est extrait avec 3 portions de 80 ml d'acide chlorhydrique à 10 %, 3 portions de 80 ml de solution saturée de bicarbonate de sodium et 3 portions de 80 ml d'eau. La solution chloroformique est concentrée et le résidu (18 g) est dissous dans 55 ml d'éther et maintenu à 5°C pendant plusieurs heures. Le 1,2,3,5-tétra-O-benzoyl-2-C-méthyl- β -D-ribofuranose qui précipite, 8,25 g (23 %), est séparé par filtration : P.F. 156,5-157,5°C, $[\alpha]_D^{20} + 68^\circ$ (c 1, chloroforme). Les filtrats réunis donnent par concentration une huile résiduelle (10 g) contenant principalement du 1,2,3,5-tétra-O-benzoyl-2-C-méthyl- α -D-ribofuranose et une petite quantité de l'anomère β . Le 1,2,3,5-tétra-O-benzoyl-2-C-méthyl- α -D-ribofuranose est obtenu sous forme d'une huile, $[\alpha]_D^{20} + 67^\circ$ (c 1, chloroforme), par chromatographie de l'huile résiduelle sur gel de silice dans un mélange chloroforme-acétate d'éthyle.

En employant comme matière première le 1,3,5-tri-O-benzoyl-2-C-méthyl- α (et β)-D-ribofuranose, on obtient le même produit.

Si, au lieu du chlorure de benzoyle, on utilise 11 ml d'anhydride acétique, on obtient le 1-O-acétyl-2,3,5-tri-O-benzoyl-2-C-méthyl- α (et β)-D-ribofuranose.

Si, au lieu du 2,3,5-tri-O-benzoyl-2-C-méthyl- α (et β)-D-ribofuranose, on utilise dans le mode opératoire ci-dessus 9,3 g (32 mmoles) de 2,3,5-tri-O-acétyl-2-C-méthyl- α (et β)-D-ribofuranose, on obtient le 2,3,5-tri-O-acétyl-1-O-benzoyl-2-C-méthyl- α (et β)-ribofuranose.

Exemple 5 -

1,2-di-O-p-nitrobenzoyl-3,5-di-O-benzoyl-2-C-méthyl- α (et β)-D-ribofuranose

- Une solution de 290 mg (0,78 mmol) de 3,5-di-O-benzyl-2-C-méthyl- α (et β)-D-ribofuranose dans 10 ml de pyridine sèche est traitée par 445 mg (2,4 mmol) de chlorure de p-nitrobenzoyl. On chauffe le mélange pendant 3 heures à 45°C et on le verse dans 20 ml d'une
- 5 solution saturée de bicarbonate de sodium et de la glace. La gomme qui précipite est extraite dans deux portions de 25 ml de chloroforme et la solution chloroformique est lavée avec deux portions de 25 ml d'acide chlorhydrique à 10 %, deux portions d'une solution saturée de bicarbonate de sodium et deux portions d'eau. La couche chloroformique
- 10 donne par concentration une huile résiduelle qui cristallise par addition d'éther. Le solide est recristallisé dans un mélange benzène-éther de pétrole et donne 102 mg (20 %) de 1,2-di-O-p-nitrobenzoyl-3,5-di-O-benzoyl-2-C-méthyl- β -D-ribofuranose, fondant à 207-208°C.

Exemple 6 -

- 15 Méthyl 2,3,5-tri-O-benzoyl-2-C-méthyl- α (et β)-D-ribofuranoside

Une solution de 4,66 g (10 mmol) de 2,3,5-tri-O-benzoyl-2-C-méthyl- α (et β)-D-ribofuranose dans 100 ml de méthanol sec est traitée avec 10 ml d'une solution à 20 % (en poids) d'acide chlorhydrique dans le méthanol sec. On maintient la solution à 25°C pendant

20 4 heures et on la neutralise avec un excès de bicarbonate de sodium, puis on la filtre. Le filtrat donne par concentration une huile résiduelle et on purifie le méthyl 2,3,5-tri-O-benzoyl-2-C-méthyl- α (et β)-D-ribofuranoside par chromatographie sur gel de silice dans le chloroforme.

- 25 Si on utilise comme matière première dans le mode opératoire précédent 2,9 g (10 mmol) de 2,3,5-tri-O-acétyl-2-C-méthyl- α (et β)-D-ribofuranose, on obtient le méthyl 2,3,5-tri-O-acétyl-2-C-méthyl- α (et β)-D-ribofuranoside.

- 30 Si on utilise comme matière première dans le mode opératoire précédent 6,0 g (10 mmol) de 2,3,5-tri-O-p-nitrobenzoyl-2-C-méthyl- α (et β)-D-ribofuranose, on obtient le méthyl 2,3,5-tri-O-p-nitrobenzoyl-2-C-méthyl- α (et β)-D-ribofuranoside.

- 35 Si, au lieu du méthanol, on utilise, dans le processus, de l'éthanol, on obtient l'éthyl 2,3,5-tri-O-benzoyl-2-C-méthyl- α (et β)-D-ribofuranoside correspondant.

Exemple 7 -

Chlorure de 2,3,5-tri-O-benzoyl-2-C-méthyl-D-ribofuranosyle à partir du 1,2,3,5-tétra-O-benzoyl-2-C-méthyl- β -D-ribofuranose

- 40 A une solution d'éther saturée à 0°C avec de l'acide chlorhydrique contenue dans un ballon à fond rond, on ajoute 12 ml de chlorure d'acétyl et 6 g (10 mmol) de 1,2,3,5-tétra-O-benzoyl-2-C-méthyl- β -ribofuranose. Le ballon est bien bouché et maintenu à 25°C pendant 2,5 heures. Le composé se dissout au cours de la première heure.

Le solvant est éliminé sous pression réduite et 75 ml de toluène sec sont de même distillés du résidu. Le résidu est dissous dans 300 ml d'éther sec et extrait rapidement avec 3 portions de 120 ml de bicarbonate de sodium saturé froid et deux portions de 120 ml d'eau froide. La couche étherée est séchée et concentrée sous pression réduite. Le chlorure de 2,3,5-tri-O-benzoyl-D-ribofuranosyle (5,0 g) est obtenu sous forme d'une huile : chromatographie en couche mince sur alumine dans le benzène-chloroforme (1:1), R_f 0,3; $\tau_{CDCl_3}^{60 Mc}$ 3,13 (singlet, C-1 proton, $J_{3,4}$ 7,5 o.p.s.), 5,27 (multiplet, C-4 et C-5 protons), 8,02 p.p.m. (singlet, C-2 méthyl protons).

Exemple 8 -

Chlorure de 2,3,5-tri-O-benzoyl-2-C-méthyl-D-ribofuranosyle à partir du 1,2,3,5-tétra-O-benzoyl-2-C-méthyl- α -D-ribofuranose

Une solution de 5,9 g (10 mmoles) de 1,2,3,5-tétra-O-benzoyl-2-C-méthyl- α -D-furanose dans 105 ml d'acide acétique contenant 5 ml de chlorure d'acétyle est ajoutée dans un ballon à fond rond contenant 260 ml d'éther et 4 ml de chlorure d'acétyle saturé avec de l'acide chlorhydrique à 0°C; le ballon est bien bouché et maintenu à 25°C pendant 48 heures. Les solvants sont éliminés sous pression réduite. Le résidu est dissous dans 150 ml d'éther et est extrait avec trois portions de 75 ml de bicarbonate de sodium saturé froid et 3 portions de 75 ml d'eau froide. La couche étherée est séchée sur sulfate de magnésium anhydre. Le mélange est filtré et le filtrat est concentré sous pression réduite. Le résidu (5,8 g) qui consiste en un mélange de chlorure de 2,3,5-tri-O-benzoyl-2-C-méthyl-D-ribofuranosyle et de 1-O-acétyl-2,3,5-tri-O-benzoyl-2-C-méthyl- α (et β)-D-ribofuranose est dissous dans 250 ml d'éther contenant 0,5 ml de chlorure d'acétyle et saturé d'acide chlorhydrique. Après repos pendant 2,5 heures à 25°C, on concentre la solution sous pression réduite. On distille 3 portions de 50 ml de toluène sec du résidu sous pression réduite. Le chlorure de 2,3,5-tri-O-benzoyl-2-C-méthyl-D-ribofuranosyle qui reste a les mêmes propriétés que le produit obtenu selon l'exemple 7.

Si on emploie comme matière première 6,1 g (10 mmoles) de 1-O-acétyl-2,3,5-tri-O-p-nitrobenzoyl-2-C-méthyl- α (et β)-D-ribofuranose dans le mode opératoire ci-dessus, on obtient le chlorure de 2,3,5-tri-O-p-nitrobenzoyl-2-C-méthyl-D-ribofuranosyle.

Si, dans le mode opératoire ci-dessus, on remplace le 1,2,3,5-tétra-O-benzoyl-2-C-méthyl- α -D-ribofuranose par une quantité équivalente de méthyl 2,3,5-tri-O-benzoyl-2-C-méthyl- α (et β)-D-ribofuranoside (comme préparé selon l'exemple 6) ou de méthyl 2,3,5-tri-O-benzoyl-2-C-éthyl- α -D-ribofuranoside (comme préparé selon l'exemple 15) on obtient le chlorure de 2,3,5-tri-O-benzoyl-2-C-méthyl-ou 2-C-éthyl)-D-ribofuranosyle.

Exemple 9 -Bromure de 2,3,5-tri-O-acétyl-2-C-méthyl-D-ribofuranosyle

- Une solution de 3,9 g (10 mmoles) de 2,3,5-tri-O-acétyl-1-O-benzoyl-2-C-méthyl- α (et β)-D-ribofuranose dans 105 ml d'acide acétique
- 5 contenant 5 ml de bromure d'acétyle est ajoutée à 260 ml d'éther et 4 ml de bromure d'acétyle saturée d'acide bromhydrique à 0°C dans un ballon à fond rond. Le ballon est bien bouché et maintenu à 25°C pendant 48 heures. Les solvants sont éliminés sous pression réduite. Le résidu est dissous dans 50 ml d'éther et on extrait la solution
- 10 avec 3 portions de 75 ml de bicarbonate de sodium saturé froid et 3 portions d'eau froide. La solution étherée est séchée sur sulfate de sodium anhydre. Le mélange est filtré et le filtrat concentré sous pression réduite. Le résidu est dissous dans un mélange de 250 ml d'éther et de 0,5 ml de bromure d'acétyle saturé d'acide bromhydrique
- 15 à 0°C. Après repos de 2,5 heures à 25°C la solution est concentrée sous pression réduite. 3 portions de 50 ml de toluène sec sont distillées du résidu sous pression réduite. On obtient un résidu de bromure de 2,3,5-tri-O-acétyl-2-C-méthyl-D-ribofuranosyle.

Exemple 10 -Bromure de 2,3,5-tri-O-benzoyl-2-C-méthyl-D-ribofuranosyle

- Une solution de 1,5 g (2,6 mmoles) de 1,2,3,5-tétra-O-benzoyl-2-C-méthyl- α -D-ribofuranose dans 7,5 ml d'acide acétique est traitée avec 0,25 ml de bromure d'acétyle et 7,5 ml d'une solution à 32 % (en poids) d'acide bromhydrique dans l'acide acétique. Le mélange
- 25 est maintenu à 25°C pendant 24 heures. Le mélange est concentré et une portion de toluène sec est distillée sous pression réduite du résidu pour enlever l'excès d'acide bromhydrique et d'acide acétique. Le résidu est dissous dans l'éther sec et lavé rapidement avec du bicarbonate de sodium saturé froid et finalement avec de l'eau froide. Après
- 30 séchage, la solution étherée est concentrée et on obtient un résidu de bromure de 2,3,5-tri-O-benzoyl-2-C-méthyl- β -D-ribofuranosyle.

- Si, au lieu de la matière première utilisée précédemment, on emploie une quantité équivalente de méthyl-2,3,5-tri-O-benzoyl-2-C-méthyl- α (et β)-D-ribofuranoside (comme préparé dans l'exemple 6) ou
- 35 de méthyl 2,3,5-tri-O-benzoyl-2-C-éthyl- α -D-ribofuranoside (comme préparé dans l'exemple 15), on obtient le bromure de 2,3,5-tri-O-benzoyl-2-C-méthyl(ou 2-C-éthyl)- β -D-ribofuranosyle.

Exemple 11 -1,3,5-tri-O-benzoyl- α -D-ribofuranose

- 40 Une solution de chlorure de 2,3,5-tri-O-benzoyl-D-ribofuranosyle (préparée à partir de 9,2 g de 1-O-acétyl-2,3,5-tri-O-benzoyl- β -D-ribofuranoside) dans 36 ml d'acétone et 1,7 ml d'eau est maintenue à 25°C pendant une heure. La solution est diluée avec 100 ml de chlorure

de méthylène et lavée avec 25 ml d'une solution froide à 10 % d bicarbonat de sodium. La phase organique est séchée sur MgSO_4 anhydre et concentrée sous pression, ce qui donne une huile résiduelle. L'addition d'éther à l'huile provoque la cristallisation et on obtient 3,0 g de 1,3,5-tri-O-benzoyl- α -ribofuranose, fondant à 140-143°C.

Exemple 12 -

Méthyl 3,5-di-O-benzoyl- α (et β)-D-ribofuranoside

Une solution de 5 g de 1,3,5-tri-O-benzoyl- α -D-ribofuranose dans 1000 ml d'une solution à 1 % d'acide chlorhydrique dans le méthanol est maintenue à 25°C pendant 4 heures. L'acide chlorhydrique est neutralisé avec du carbonate de sodium solide et le mélange est filtré. Le filtrat est concentré à sec sous pression réduite et le résidu est lavé avec deux portions de 250 ml de chlorure de méthylène. Les extraits chlorométhyléniques sont réunis et concentrés sous pression réduite. L'huile résiduelle est chromatographiée sur gel de silice dans un mélange benzène-acétate d'éthyle (4:1). Après élution de matières premières n'ayant pas réagi, on obtient plusieurs fractions contenant du méthyl 3,5-di-O-benzoyl- β -D-ribofuranoside. Le produit est obtenu sous forme d'un solide cristallin par concentration de la solution à sec.

La concentration des fractions de la dernière colonne donne une huile résiduelle contenant principalement du méthyl-3,5-di-O-benzoyl- α -D-ribofuranoside.

Exemple 13 -

Méthyl 3,5-di-O-benzoyl- α -D-érythro-pentofuran-2-uloside

Une solution de 12,5 g de métaperiodate de sodium dans 150 ml d'eau est refroidie au bain de glace et ajoutée par portions à une suspension agitée de 1,5 g de dioxyde de ruthénium dans 150 ml de tétrachlorure de carbone refroidie au bain de glace. Environ 20 à 30 minutes après la fin de l'addition, la plus grande partie du dioxyde de ruthénium noir est transformée en une solution de tétraoxyde de ruthénium jaune. La couche de tétrachlorure de carbone est séparée de la couche aqueuse et ajoutée en 15 minutes à une solution agitée de 2,2 g (6 mmoles) de méthyl 3,5-di-O-benzoyl- α -D-ribofuranoside dans 150 ml de tétrachlorure de carbone. Après une heure, le mélange réactionnel, qui contient maintenant un précipité noir de dioxyde de ruthénium, est chauffé à température ordinaire et agité pendant encore 2 heures. La marche de la réaction peut être suivie par chromatographie en couche mince sur gel de silice dans le mélange benzène-acétate d'éthyle (4:1). Le mélange réactionnel est traité avec 1 ml d'isopropanol dans 5 ml de tétrachlorure de carbone pour décomposer le tétraoxyde de ruthénium n'ayant pas réagi. Le dioxyde de ruthénium noir est éliminé et lavé à l'eau; les filtrats réunis sont lavés avec 10 ml de soluti n

5 saturée de bicarbonate de sodium. La couche de tétrachlorure de carbone est concentrée sous pression réduite et on obtient un résidu contenant le méthyl 3,5-di-O-benzoyl- α -D-pentofuran-2-uloside. Le produit est purifié par chromatographie sur gel de silice suivie d'une cristallisation dans un mélange éther-éther de pétrole.

Exemple 14 -

Méthyl 3,5-di-O-benzoyl-2-C-éthyl- α -D-ribofuranoside

10 Une solution d'iodure d'éthyl magnésium est préparée par addition de 3,2 g (21 mmoles) d'iodure d'éthyle dans 50 ml d'éther sec à une suspension agitée de 0,64 g (26,4 mmoles) de tournures de magnésium dans 10 ml d'éther sec. La solution du réactif de Grignard est ajoutée à une solution agitée de 0,98 g (2,64 mmoles) de méthyl 3,5-di-O-benzoyl- α -D-érythro-pentofuran-2-uloside dans 60 ml d'éther sec à 5°C. Le mélange réactionnel est versé dans un mélange froid et agité de 80 ml d'éther et 10 g de chlorure d'ammonium dissous dans 120 ml d'eau. La couche aqueuse est séparée et extraite avec 3 portions de 40 ml d'éther. Les couches étherées sont réunies, lavées avec 20 ml d'une solution saturée de chlorure de sodium et séchées sur sulfate de magnésium anhydre. Par concentration de la solution étherée sous pression réduite, on obtient un résidu contenant le méthyl 3,5-di-O-benzoyl-2-C-éthyl- α -D-ribofuranoside. Le produit est purifié par chromatographie sur gel de silice dans le mélange benzène-acétate d'éthyle (4:1).

Exemple 15 -

Méthyl 2,3,5-tri-O-benzoyl-2-C-éthyl- α -D-ribofuranoside

25 A 6,1 g (15,3 mmoles) de méthyl 3,5-di-O-benzoyl-2-C-éthyl- α -D-ribofuranoside dans 50 ml de pyridine sèche (BaO) on ajoute 4,4 g (30,6 mmoles) de chlorure de benzoyle et on chauffe le mélange à 90±5°C pendant 16 heures. Le mélange est refroidi à 25°C, agité avec 5 ml d'eau pendant 30 minutes et ajouté à 250 ml d'acide chlorhydrique à 10 % et 300 ml de chloroforme. La couche aqueuse est extraite avec 2 portions de 250 ml de chloroforme et les couches chloroformiques réunies sont lavées avec 2 portions de 200 ml de solution saturée de bicarbonate de sodium et 300 ml de solution saturée de chlorure de sodium. On sèche la solution chloroformique sur du sulfate de magnésium anhydre, et on la concentre sous pression réduite; l'huile résiduelle est chromatographiée sur gel de silice dans le chloroforme. Après élimination du solvant venant de fractions de colonnes antérieures, on obtient le méthyl 2,3,5-tri-O-benzoyl-2-C-éthyl- α -D-furanoside purifié.

Exemple 16 -

40 2-C-méthyl-D-ribofuranose

Une solution de 2,05 g (4,0 mmoles) de méthyl 2,3,5-tri-O-benzoyl-2-C-méthyl-D-ribofuranoside, comme préparé dans l'exemple 6, dans 50 ml de méthanol est traitée avec 5 ml d'hydrate de baryum

0,5N dans le méthanol. Après avoir porté au reflux pendant 30 minutes, la solution est concentrée à 10 ml environ et diluée avec 50 ml d'eau. On ajoute 5 ml d'acide sulfurique 0,5N et filtre le sulfate de baryum qui a précipité. Le filtrat est acidifié à pH 2 avec de l'acide chlorhydrique et évaporé à sec. Le résidu contient du 2-C-méthyl-D-ribofuranose.

En opérant comme ci-dessus, mais en partant de méthyl 2,3,5-tri-O-benzoyl-2-C-éthyl-D-ribofuranoside comme préparé dans l'exemple 15, le produit obtenu est le 2-C-éthyl-D-ribofuranose.

10 Exemple 17 -

1,2-O-isopropylidène-5-O-benzoyl-3-méthyl-D-ribofuranose

On prépare un réactif de Grignard, l'iodure de méthyl magnésium, à partir de 690 mg (28,4 mmoles) de magnésium et 3,85 g (27,5 mmoles) d'iodure de méthyle dans 32 ml d'éther sec et on l'ajoute à une solution agitée de 1,0 g (3,43 mmoles) de 1,2-O-isopropylidène-5-O-benzoyl- α -D-érythro-pentofuran-3-ulose dans 100 ml d'éther sec à 5°C. Après trois heures environ le mélange réactionnel est versé dans un mélange de 50 g de chlorure d'ammonium, 200 ml d'eau glacée et 200 ml d'éther. On sépare les couches et on extrait la phase aqueuse avec deux portions de 150 ml d'éther. La solution étherée, séchée sur MgSO₄, est évaporée à sec et le résidu (1,24 g) est cristallisé dans l'éther. On obtient en tout 524 mg de 1,2-O-isopropylidène-5-O-benzoyl-3-C-méthyl- α -D-ribofuranose.

Si on fait réagir un réactif de Grignard préparé à partir de bromure d'éthyle avec le 1,2-O-isopropylidène-5-O-benzoyl- α -D-érythro-pentofuran-3-ulose en opérant comme ci-dessus, on obtient le 1,2-O-isopropylidène-5-O-benzoyl-3-C-éthyl- α -D-ribofuranose.

Exemple 18 -

Méthyl 5-O-benzoyl-3-C-méthyl-D-ribofuranoside

Une solution de 1,0 g (3,25 mmoles) de 1,2-O-isopropylidène-5-O-benzoyl-3-C-méthyl- α -D-ribofuranose dans 25 ml d'acide chlorhydrique méthanolique à 3 % est maintenue à 25°C pendant 75 minutes. L'acide chlorhydrique est neutralisé par addition en plusieurs fois de 2,5 g (30 mmoles) de bicarbonate de sodium. Le mélange est filtré et le solide est lavé au méthanol. Le filtrat et les liqueurs de lavages sont concentrés et le résidu est épuisé avec 3 portions de 50 ml de chlorure de méthylène. La solution chlorométhylénique est traitée avec une petite quantité de noir décolorant, filtrée et concentrée. Le résidu est chromatographié sur 20 g de gel de silice. L'élution avec l'acétate d'éthyle-chloroforme (1:9) donne 290 mg de méthyl 5-O-benzoyl-2,3-O-isopropylidène-3-C-méthyl- α -D-ribofuranoside brut. Une nouvelle élution avec l'acétate d'éthyle-chloroforme (1:9) donne environ 240 mg d'un mélange de produits. Finalement, une élution avec

l'acétate d'éthyle-chloroforme (1:1) donne 420 mg de méthyl 5-O-benzoyl-3-C-méthyl-D-ribofuranoside sous forme d'une huile.

En opérant comme ci-dessus, mais en partant de 5-O-benzoyl-1,2-O-isopropylidène-3-C-éthyl- α -D-ribofuranose, on obtient le

5 méthyl 5-O-benzoyl-3-C-éthyl-D-ribofuranoside.

Exemple 19 -

Éthyl 5-O-benzoyl-3-C-méthyl-D-ribofuranoside

Une solution de 1,1 g (3,25 mmoles) de 1,2-O-isopropylidène-5-O-benzoyl-3-C-méthyl- α -D-ribofuranose dans 25 ml d'acide chlorhydrique éthanolique est maintenue à 25°C pendant 75 minutes. L'acide chlorhydrique est neutralisé avec du bicarbonate de sodium solide. Le mélange est filtré, le filtrat est concentré et le résidu est extrait au chlorure de méthylène. La solution chlorométhylénique est concentrée et l'huile qui reste est chromatographiée sur gel de silice.

15 L'élution avec l'acétate d'éthyle-chloroforme donne l'éthyl 5-O-benzoyl-3-C-méthyl-D-ribofuranose sous forme d'une huile.

Exemple 20 -

Méthyl 2,3,5-tri-O-benzoyl-3-C-méthyl-D-ribofuranose

Les 420 mg (1,49 mmoles) de méthyl 5-O-benzoyl-3-C-méthyl-D-ribofuranoside de l'exemple 18 sont dissous dans 7,5 ml de pyridine sèche et refroidis sur bain de glace. Une solution de 463 mg (3,3 mmoles) de chlorure de benzyle dans 2,5 ml de chloroforme sec est ajoutée goutte à goutte en agitant. Le mélange réactionnel est maintenu à 25°C pendant 24 heures et on ajoute alors 0,5 ml d'eau. Après

25 30 minutes le mélange est versé sur 30 ml d'eau glacée et extrait avec 3 portions de 30 ml de chloroforme. La solution chloroformique est lavée avec de l'acide chlorhydrique à 5 % froid jusqu'à ce que les lavages soient acides et finalement avec une solution saturée de chlorure de sodium. La solution chloroformique séchée (MgSO_4) est

30 évaporée à sec et on obtient un résidu de méthyl 2,5-di-O-benzoyl-3-C-méthyl-D-ribofuranoside.

Une solution de 230 mg (0,595 mmoles) de méthyl 2,5-di-O-benzoyl-3-C-méthyl-D-ribofuranoside dans 3 ml de pyridine sèche est traitée avec une solution de 90 mg (0,64 mmoles) de chlorure de

35 benzyle dans 1 ml de chloroforme sec. Le mélange est chauffé à 100°C pendant 16 heures, refroidi à 25°C, traité avec 0,5 ml d'eau et chauffé à 40°C. Le mélange refroidi est ajouté à un mélange de glace et d'eau et extrait avec 3 portions de 50 ml de chloroforme. Le chloroforme est lavé avec de l'acide chlorhydrique à 10 % jusqu'à ce que les lavages

40 soient acides, puis avec du bicarbonate de sodium à 10 %. La couche chloroformique séchée (MgSO_4) est concentrée et le résidu (370 mg) est chromatographié sur 8 g de gel de silice. On obtient le méthyl 2,3,5-tri-O-benzoyl-3-C-méthyl-D-ribofuranoside (280 mg; 95 %).

Si on opère comme ci-dessus, mais en partant du méthyl 5-O-benzoyl-3-C-éthyl-D-ribofuranoside de l'exemple 18, on obtient 1 méthyl 2,5-di-O-benzoyl-3-C-éthyl-D-ribofuranoside et le méthyl 2,3,5-tri-O-benzoyl-3-C-éthyl-D-ribofuranoside.

5 Exemple 21 -

Ethyl 2,3-di-O-acétyl-5-O-benzoyl-3-C-méthyl-D-ribofuranoside

Une solution de 1 g (3,4 mmoles) d'éthyl 5-O-benzoyl-3-C-méthyl-D-ribofuranoside, comme préparé dans l'exemple 19, dans 20 ml de pyridine sèche est refroidie et traitée avec 1,0 g (10 mmoles) d'anhydride acétique. Le mélange est maintenu à 25°C pendant une heure, chauffé à 100°C pendant 20 heures, refroidi à 25°C et traité avec 1 ml d'eau. Le mélange est ajouté à de l'eau glacée et le produit est extrait avec trois portions de 100 ml de chloroforme. La solution chloroformique est lavée avec de l'acide chlorhydrique à 10 % pour enlever l'excès de pyridine et finalement lavée jusqu'à neutralité avec du bicarbonate de sodium en solution diluée. La solution chloroformique, séchée sur $MgSO_4$, est concentrée et on obtient un résidu d'éthyl 2,3-di-O-acétyl-5-O-benzoyl-3-C-méthyl-D-ribofuranoside.

Exemple 22 -

20 Bromure de 2,3,5-tri-O-benzoyl-3-C-méthyl-D-ribofuranosyle

Une solution de 2 g (4,04 mmoles) de méthyl 2,3,5-tri-O-benzoyl-3-C-méthyl-D-ribofuranoside, comme préparé dans l'exemple 20, dans 10 ml d'acide acétique est refroidie au bain de glace; on ajoute 1 ml de bromure d'acétyle, puis 10 ml d'une solution d'acide bromhydrique à 33 % dans l'acide acétique. Après 15 heures à 0°-5°C, la solution est maintenue à 25°C pendant 35 minutes. Par concentration on obtient une huile résiduelle qui est débarrassée des dernières traces d'acide bromhydrique par distillation avec 3 portions de toluène sec. On obtient le bromure de 2,3,5-tri-O-benzoyl-3-C-méthyl-D-ribofuranosyle.

30 Exemple 23 -

Bromure de 2,3-di-O-acétyl-5-O-benzoyl-3-C-méthyl-D-ribofuranosyle

Une solution de 1,52 g (4,0 mmoles) d'éthyl 2,3-di-O-acétyl-5-O-benzoyl-3-C-méthyl-D-ribofuranoside préparé dans l'exemple 21, dans 10 ml d'acide acétique est refroidie au bain de glace. On ajoute 1 ml de bromure d'acétyle, puis 10 ml d'une solution d'acide bromhydrique à 33 % dans l'acide acétique. On maintient la solution à 25°C pendant 50 minutes et on la concentre; on obtient un résidu de bromure de 2,3-di-O-acétyl-5-O-benzoyl-3-C-méthyl-D-ribofuranosyle. Les dernières traces d'acide bromhydrique et d'acide acétique sont éliminées en distillant trois portions de toluène sec du produit.

40 Exemple 24 -

Chlorure de 2,3,5-tri-O-benzoyl-3-C-méthyl-D-ribofuranosyle

Un solution de 2 g (4,0 mmoles) de méthyl 2,3,5-tri-O-

benzoyl-3-C-méthyl-D-ribofuranoside, comme préparé dans l'exemple 20, dans 10 ml d'acide acétique est refroidie au bain de glace. On ajoute 1 ml de chlorure d'acétyl, puis 10 ml d'une solution à 20 % (en poids) d'acide chlorhydrique dans l'acide acétique. On laisse reposer pendant 5 48 heures à 25°C et concentre. On distille trois portions de toluène sec du résidu pour enlever les dernières traces d'acide acétique et d'acide chlorhydrique. Il reste du chlorure de 2,3,5-tri-O-benzoyl-3-C-méthyl-D-ribofuranosyle.

Exemple 25 -

10 3-C-méthyl-D-ribofuranose

Une solution de 2,0 g (4,0 mmoles) de méthyl-2,3,5-tri-O-benzoyl-3-C-méthyl-D-ribofuranoside, comme préparé dans l'exemple 20, dans 50 ml de méthanol est traitée avec 5 ml de méthoxyde de baryum 0,5N. On chauffe à reflux pendant 30 minutes, puis on concentre la 15 solution à 10 ml environ et la dilue avec 50 ml d'eau. On ajoute 5 ml d'acide sulfurique 0,5N et filtre le sulfate de baryum précipité. Le filtrat est acidifié à pH 2 avec de l'acide chlorhydrique et maintenu à 60°C pendant plusieurs heures. La concentration de la solution aqueuse donne un résidu contenant le 3-C-méthyl-2-ribofuranose.

20 Exemple 26 -

1,2-O-isopropylidène-3,5-di-O-benzoyl-3-C-méthyl-α-D-ribofuranose

Une solution de 1,0 g (3,54 mmoles) de 1,2-isopropylidène-5-O-benzoyl-3-C-méthyl-α-D-ribofuranose, comme préparé dans l'exemple 17, dans 12 ml de pyridine sèche est refroidie, agitée et traitée avec 25 une solution de 750 mg (5,3 mmoles) de chlorure de benzoyle dans 2 ml de chloroforme sec. On maintient le mélange à 25°C pendant 72 heures, on y ajoute 0,5 ml d'eau; on agite pendant une heure et verse le mélange dans 75 ml d'eau glacée. On ajoute environ 25 ml d'acide chlorhydrique à 10 % et extrait le mélange avec du chloroforme; 30 l'extrait chloroformique est lavé au bicarbonate de sodium à 10 % et une solution saturée de chlorure de sodium. La couche chloroformique séchée est concentrée. Le résidu cristallisé dans 1 ml de benzène et 25 ml d'éther de pétrole donne 700 mg de 1,2-O-isopropylidène-3,5-di-O-benzoyl-3-C-méthyl-α-D-ribofuranose.

35 Exemple 27 -

1,2-di-O-acétyl-3,5-di-O-benzoyl-3-C-méthyl-D-ribofuranose

A un mélange de 130 ml d'acide acétique et 14,4 ml d'anhydride acétique, on ajoute 11,5 g (28 mmoles) de 3,5-di-O-benzoyl-1,2-O-isopropylidène-3-C-méthyl-α-D-ribofuranose, comme préparé dans l'exem- 40 ple 26. Au mélange agité, on ajoute goutte à goutte en 45 minutes 7,8 ml d'acide sulfurique concentré. On se sert d'un bain de glace pour maintenir la température à 15-20°C pendant l'addition de l'acide sulfurique. On garde le mélange à température ordinaire pendant 16 heures,

puis on le verse dans 630 ml d'eau glacée. Le produit est extrait avec deux portions de 120 ml de chloroforme et l'extrait est lavé avec 3 portions de 75 ml de bicarbonate de sodium 1N. La concentration de la solution chloroformique séchée (MgSO_4) donne un résidu de 1,2-di-0-acétyl-3,5-di-0-benzoyl-3-C-méthyl-D-ribofuranose.

Exemple 28 -

1,2-di-0-propionyl-3,5-di-0-benzoyl-3-C-méthyl-D-ribofuranose

A un mélange de 150 ml d'acide propionique et de 17 ml d'anhydride propionique, on ajoute 11,5 g (28 mmoles) de 3,5-di-0-benzoyl-1,2-0-isopropylidène-3-C-méthyl- α -D-ribofuranose, comme préparé dans l'exemple 26. Au mélange agité on ajoute goutte à goutte en 45 minutes 7,8 ml d'acide sulfurique concentré. On se sert d'un bain de glace pour maintenir la température du mélange à 15-20°C pendant l'addition de l'acide sulfurique. On maintient la solution à température ordinaire pendant 16 heures et on la verse dans 630 ml d'eau glacée. Le produit est extrait avec 2 portions de 120 ml de chloroforme et l'extrait chloroformique est lavé avec trois portions de 75 ml de bicarbonate de sodium 1N. La concentration de la solution chloroformique séchée (MgSO_4) donne un résidu de 1,2-di-0-propionyl-3,5-di-0-benzoyl-3-C-méthyl-D-ribofuranose.

Exemple 29 -

1,2-di-0-butyryl-3,5-di-0-benzoyl-3-C-méthyl-D-ribofuranose

A un mélange de 160 ml d'acide butyrique et 196 ml d'anhydride butyrique on ajoute 11,5 g (28 mmoles) de 3,5-di-0-benzoyl-1,2-0-isopropylidène-3-C-méthyl- α -D-ribofuranose, comme préparé dans l'exemple 26. Au mélange agité on ajoute goutte à goutte en 45 minutes 7,8 ml d'acide sulfurique concentré. On se sert d'un bain de glace pour maintenir la température du mélange à 15-20°C pendant l'addition de l'acide sulfurique. On maintient la solution à température ordinaire pendant 16 heures et on la verse dans 630 ml d'eau glacée. Le produit est extrait avec 2 portions de 120 ml de chloroforme et l'extrait chloroformique est lavé avec 3 portions de 75 ml de bicarbonate de sodium 1N. La concentration de la solution chloroformique séchée (MgSO_4) donne un résidu de 1,2-di-0-butyryl-3,5-di-0-benzoyl-3-C-méthyl-D-ribofuranose.

Exemple 30 -

1,2-0-isopropylidène-3,5-di-0-benzoyl-3-C-éthyl-D-ribofuranose

On prépare un réactif de Grignard avec 690 mg (28 mmoles) de magnésium et 3,97 g de bromure d'éthyle dans 45 ml d'éther sec et on l'ajoute à une solution agitée de 1,0 g (3,42 mmoles) de 1,2-0-isopropylidène-5-0-benzoyl- α -D-érythro-pentofuran-3-ulose dans 100 ml d'éther sec à 5°C. Après 3 heures le produit de réaction est versé dans un mélange de 50 g de chlorure d'ammonium, 200 ml d'eau glacée et 200 ml

d'éther. Les couches sont séparées et la phase aqueuse est extraite avec 2 portions de 150 ml d'éther. La solution étherée séchée (MgSO_4) est concentrée et donne un résidu de 1,2-O-isopropylidène-5-O-benzoyl-3-C-éthyl- α -D-ribofuranose.

- 5 Une solution de 1,05 g (3,54 mmoles) de 1,2-O-isopropylidène-5-O-benzoyl-3-C-éthyl- α -D-ribofuranose dans 12 ml de pyridine sèche est traitée avec 750 mg (5,3 mmoles) de chlorure de benzoyl dans 2 ml de chloroforme sec. On maintient à 25°C pendant 72 heures, ajoute 0,5 ml d'eau, agite pendant 1 heure et verse le mélange dans 75 ml d'eau glacée. On ajoute environ 25 ml d'acide chlorhydrique à 10 % et on extrait le mélange avec du chloroforme, qu'on lave avec du bicarbonate de sodium à 10 %. La couche chloroformique est concentrée et le 1,2-O-isopropylidène-3,5-di-O-benzoyl-3-C-éthyl- α -D-ribofuranose est cristallisé dans le benzène-éther de pétrole.

15 Exemple 31 -

1,2-di-O-acétyl-3,5-di-O-benzoyl-3-O-éthyl-D-ribofuranose

- A un mélange de 130 ml d'acide acétique et de 14,4 ml d'anhydride acétique on ajoute 11,8 ml (28,8 mmoles) de 1,2-O-isopropylidène-3,5-di-O-benzoyl-3-C-éthyl- α -D-ribofuranose comme préparé dans l'exemple 30. Au mélange agité on ajoute goutte à goutte en 45 minutes 7,8 ml d'acide sulfurique concentré. On se sert d'un bain de glace pour maintenir la température du mélange à 15-20°C pendant l'addition de l'acide sulfurique. On maintient la solution à la température ordinaire pendant 16 heures, puis on la verse dans 630 ml d'eau glacée. Le produit est extrait avec deux portions de 120 ml de chloroforme qu'on lave avec trois portions de 75 ml de bicarbonate de sodium 1N. Par concentration de la solution chloroformique séchée (MgSO_4), on obtient un résidu de 1,2-di-O-acétyl-3,5-di-O-benzoyl-3-C-éthyl-D-ribofuranose.

Exemple 32 -

30 Bromure de 2,3,5-tri-O-benzoyl-3-C-éthyl-D-ribofuranosyle

- Une solution de 2,0 g (4,0 mmoles) de méthyl 2,3,5-tri-O-benzoyl-3-C-éthyl-D-ribofuranoside, comme préparé dans l'exemple 20, dans 10 ml d'acide acétique, est refroidie au bain de glace et on y ajoute 1 ml de bromure d'acétyle, puis 10 ml d'une solution à 33 % d'acide bromhydrique dans l'acide acétique. La solution est maintenue à 0-5°C pendant 15 minutes, puis à 25°C pendant 35 minutes. La concentration de la solution donne une huile résiduelle qui est débarrassée des dernières traces d'acide bromhydrique et d'acide acétique par distillation de trois portions de toluène et on obtient un résidu de bromure de 2,3,5-tri-O-benzoyl-3-C-éthyl-D-ribofuranosyle.

Exemple 33 -

3-C-éthyl-D-rib furanose

Un solution d 2,05 g (4,0 mmoles) de méthyl 2,3,5-tri-O-

benzoyl-3-C-éthyl-D-ribofuranos, comm préparé dans l'exempl 20, dans 50 ml d méthanol, et traité avec 5 ml de méthoxyde de baryum 0,5N dans le méthanol. On porte à reflux pendant 30 minutes, puis on concentre la solution jusqu'à 10 ml environ et on la dilue avec 50 ml d'eau. On ajoute 5 ml d'acide sulfurique 0,5N et filtre le précipité de sulfate de baryum. Le filtrat est acidifié à pH 2 avec de l'acide chlorhydrique et maintenu à 60°C pendant plusieurs heures. La concentration de la solution aqueuse donne un résidu contenant le 3-C-éthyl-D-ribofuranose.

10 Exemple 34 -

1-(2,3,5-tri-O-benzoyl-2-C-méthyl-β-D-ribofuranosyl)-4-méthoxy-2(1H)-pyrimidinone et 1-(2,3,5-tri-O-benzoyl-2-C-méthyl-β-D-ribofuranosyl)-uracil

Une solution de 5,24 g de chlorure de 2,3,5-tri-O-benzoyl-2-C-méthyl-D-ribofuranosyle dans 50 ml de toluène sec est ajoutée à une solution de 2,8 g (20 mmoles) de 2,4-diméthoxypyrimidine dans 50 ml de toluène. La solution est portée à reflux pendant 5 jours, après quoi on élimine le solvant sous pression réduite. Le résidu (8,7 g) est dissous dans 200 ml d'éther et lavé avec 3 portions de 50 ml d'acide chlorhydrique froid à 5 %, 2 portions de 50 ml de bicarbonate de sodium saturé froid et finalement avec plusieurs portions de 25 ml d'eau froide.

La solution étherée sèche (MgSO_4 anhydre) est concentrée sous pression réduite et donne 5,35 g d'un sirop visqueux. Le sirop est chromatographié sur 200 g de gel de silice dans benzène-acétate d'éthyle (19:1). Après élution de plusieurs sous-produits, on obtient des fractions contenant le produit désiré [R_f 0,2 par chromatographie en couche mince sur gel de silice dans benzène-acétate d'éthyle (9:1)]. Les solutions sont réunies et concentrées sous pression réduite pour donner 1,6 g (50 %) de 1-(2,3,5-tri-O-benzoyl-2-C-méthyl-β-D-ribofuranosyl)-4-méthoxy-2(1H)-pyrimidinone ; [α_D] -21° (c 1 chloroforme), $\lambda_{\text{max}}^{\text{EtOH}}$ mμ ($\epsilon \times 10^{-3}$): 229 (42,6), 275 (9,1), 280(inf.)(8,3).

Une nouvelle élution de la colonne donne des fractions contenant un second produit. Ce produit est rechromatographié et donne 89 mg de 1-(2,3,5-tri-O-benzoyl-2-C-méthyl-β-D-ribofuranosyl)uracil; P.F. 202°C (transition à 185°-195°C, [α_D] -23° (c 1 dans CDCl_3); $\lambda_{\text{max}}^{\text{EtOH}}$ mμ ($\epsilon \times 10^{-3}$) -255 (15,2), 230 (43,6).

En opérant comme ci-dessus, mais en remplaçant le chlorure de 2,3,5-tri-O-benzoyl-2-C-méthyl-D-ribofuranosyle par une quantité équivalente de chlorure de 2,3,5-tri-O-benzoyl-2-C-éthyl-D-ribofuranosyle, de chlorure de 2,3,5-tri-O-benzoyl-3-D-méthyl-D-ribofuranosyle ou de chlorure de 2,3,5-tri-O-benzoyl-3-C-éthyl-D-ribofuranosyle, on obtient les composés 2-C-éthyl, 3-C-méthyl ou 3-C-éthyl correspondants.

Exemple 35 -2'-C-méthyluridine

Une solution de 25 mg (0,035 mmole) de 1-(2,3,5-tri-O-benzoyl-2-C-méthyl-β-D-ribofuranosyl)uracil comme préparé dans l'exem-
 5 ple 34 est ajoutée à une solution préparée à partir de 1,6 mg (0,07 mg.atome) de sodium et 2 ml de méthanol. Le mélange est chauffé à reflux pendant 30 minutes et évaporé à sec. Le résidu est dissous dans 2 ml d'eau et lavé avec 3 portions de 1 ml d'éther. La concentra-
 10 tion de la couche aqueuse donne un résidu de 2'-C-méthyluridine.

De même, la 2'-C-éthyluridine, la 3'-C-méthyluridine ou la 3'-C-éthyluridine correspondante est obtenue quand on remplace la matière première utilisée ci-dessus par le 1-(2,3,5-tri-O-benzoyl-2-C-éthyl-β-D-ribofuranosyl)uracil, le 1-(2,3,5-tri-O-benzoyl-3-C-méthyl-β-D-ribofuranosyl)uracil ou le 1-(2,3,5-tri-O-benzoyl-3-C-éthyl-β-D-ribofuranosyl)uracil.
 15

Exemple 36 -2'-C-méthylcytidineà partir de la 1-(2,3,5-tri-O-benzoyl-2-C-méthyl-β-D-ribofuranosyl)-4-méthoxy-2(1H)-pyrimidinone

Une solution de 1,0 g (1,7 mmole) de 1-(2,3,5-tri-O-benzoyl-2-C-méthyl-β-D-ribofuranosyl)-4-méthoxy-2(1H)-pyrimidinone, comme préparé dans l'exemple 34, dans 14 ml de méthanol saturé d'ammoniac à 0°C, est chauffée en tube scellé à 100°C pendant 17 heures. Le solvant est éliminé sous pression réduite et le résidu est dissous dans 30 ml d'eau. Une petite quantité de benzamide est séparée par filtration et le filtrat aqueux est extrait avec 5 portions de 50 ml d'éther. La solution aqueuse est concentrée sous pression réduite à une température inférieure à 40°C et le résidu (0,5 g) est cristallisé dans le méthanol. Une recristallisation dans le méthanol donne 394 mg (90 %) de 2'-C-méthylcytidine, fondant à 243-245° (transition entre 140 et 170°C, $[\alpha]_D^{+91}$ (c 1, eau).
 20
 25
 30

De même, on obtient la 2'-C-éthylcytidine, la 3'-C-méthylcytidine ou la 3'-C-éthylcytidine quand au lieu de la matière première utilisée ci-dessus, on emploie la 1-(2,3,5-tri-O-benzoyl-2-C-éthyl-β-D-ribofuranosyl)-4-méthoxy-2(1H)-pyrimidinone, la 1-(2,3,5-tri-O-benzoyl-3-C-méthyl-β-D-ribofuranosyl)-4-méthoxy-2(1H)-pyrimidinone, ou la 1-(2,3,5-tri-O-benzoyl-3-C-éthyl-β-D-ribofuranosyl)-4-méthoxy-2(1H)-pyrimidinone.
 35

Exemple 37 -2'-C-méthylcytidineà partir de 1-(2,3,5-tri-O-benzoyl-2-C-méthyl-β-D-ribofuranosyl)-4-acétamidopyrimidine

Du chlorure de 2,3,5-tri-O-benzoyl-2-C-méthyl-β-D-ribofurano-

- syle dans 75 ml de xylène sec est ajouté à une suspension d 527 mg (2 mmoles) de N-acétylcytosine mercure dans 75 ml de xylène sec à 100°C. Le mélange est chauffé à reflux et agité pendant 30 minutes. La solution est concentrée à 35 ml, refroidie et traitée avec 175 ml
- 5 d'éther de pétrole, puis de nouveau refroidie au bain de glace. Le solide précipité est séparé, dissous dans 100 ml de chloroforme, puis lavé avec 3 portions de 40 ml de solution d'iodure de potassium à 30 % et 2 portions à 40 ml d'eau. La solution chloroformique est concentrée et le résidu (1,2 g) est chromatographié sur une petite
- 10 colonne de 40 g de gel de silice dans le chloroforme-acétate d'éthyle (1:1). L'éluant est entraîné par chromatographie en couche mince (tlc) sur des plaques de silice dans le chloroforme-acétate d'éthyle (1:1). Plusieurs fractions de tête contiennent deux produits de réaction R_f (tlc) 0,8 et 0,96. Les fractions qui suivent contiennent un produit
- 15 de réaction montrant une R_f (tlc) de 0,23. Ces fractions sont réunies et concentrées pour donner 100 g (13 % basé sur le N-acétylcytosine mercure) de 1-(2,3,5-tri-O-benzoyl-2-C-méthyl-β-D-ribofuranosyl)-4-acétamido-2(1H)-pyrimidinone sous forme vitreuse; $[\alpha]_D^{25} -46^\circ$ (c 0,86, chloroforme), $\lambda_{\max}^{\text{EtOH}}$ mμ ($\epsilon \times 10^{-3}$) : 231 (43,0), 273 inf. (8,0),
- 20 2825 (7,3), 300 (6,1).

- Les premières fractions retirées de la colonne chromatographiée sont réunies et concentrées sous pression réduite. Le résidu (1,05 g) est alors rechromatographié sur une petite colonne de 40 g de gel de silice dans le benzène-acétate d'éthyle (19:1). Plusieurs
- 25 fractions de tête donnent 200 mg de sous-produits divers; on recueille ensuite des fractions contenant 600 mg de produit. En cristallisant deux fois dans le méthanol, on obtient 400 mg (52 %) de 2-(2,3,5-tri-O-benzoyl-2-C-méthyl-β-D-ribofuranosyloxy)-4-acétamidopyrimidine fondant à 99-100°C, $[\alpha]_D^{25} + 30,2^\circ$ (c 1, chloroforme), $\lambda_{\max}^{\text{EtOH}}$ mμ ($\epsilon \times 10^{-3}$) : 230 (49,5), 274 (14,5).
- 30

- Une solution de 100 mg (0,17 mmole) de 2-(2,3,5-tri-O-benzoyl-2-C-méthyl-β-D-ribofuranosyl)-4-acétamidopyrimidine dans 20 ml de xylène sec contenant 180 mg (0,5 mmole) de bromure mercurique est chauffée à reflux pendant 4 heures. La solution xylénique chaude est
- 35 filtrée et le filtrat est concentré sous pression réduite. On ajoute le résidu à 20 ml de chloroforme et on élimine une petite quantité de produit insoluble.

- La solution chloroformique est lavée avec 3 portions de 15 ml de solution d'iodure de potassium à 30 % et trois portions de 15 ml
- 40 d'eau. La concentration de la couche chloroformique donne un résidu vitreux. Le résidu est chromatographié sur une petite colonne de gel de silice dans le benzène-acétate d'éthyle (1:1). Après élimination d'un sous-produit, on obtient des fractions contenant le produit désiré,

1-(2,3,5-tri-O-benzoyl-2-C-méthyl-β-D-ribofuranosyl)-4-acétamido-2(1H)-pyrimidinone.

Une solution de 47 mg (0,08 mmole) de 1-(2,3,5-tri-O-benzoyl-2-C-méthyl-β-D-ribofuranosyl)-4-acétamidopyrimidine dans 4 ml de méthanol saturé d'ammoniac à 0°C est chauffée en tube scellé à 100°C pendant 17 heures. La solution est concentrée sous pression réduite et le résidu est dissous dans 10 ml d'eau et extrait avec 4 portions de 2 ml de chloroforme. La couche aqueuse est lyophilisée. Le résidu est alors redissous dans 10 ml d'eau et extrait avec 5 portions de 10 ml d'éther. La concentration de la couche aqueuse sous pression réduite donne 17 mg de 2'-C-méthyl-cytidine ayant des propriétés identiques à celles de la 2'-C-méthylcytidine préparée dans l'exemple 36.

De façon analogue, on obtient la 2'-C-éthylcytidine, la 3'-C-méthylcytidine ou la 3'-C-éthylcytidine correspondante lorsque, dans le mode opératoire précédent, on remplace le chlorure de 2,3,5-tri-O-benzoyl-2-C-méthyl-D-ribofuranosyle par des quantités équivalentes de chlorure de 2,3,5-tri-O-benzoyl-2-C-éthyl-D-ribofuranosyle, de chlorure de 2,3,5-tri-O-benzoyl-3-C-méthyl-D-ribofuranosyle ou de chlorure de 2,3,5-tri-O-benzoyl-3-C-éthyl-D-ribofuranosyle.

Exemple 38 -

1-(3-C-méthyl-β-D-ribofuranosyl)cytosine [3'-C-méthylcytidine] et 1-(3-C-méthyl-α-D-ribofuranosyl)cytosine

Un mélange de 4,08 mmoles de bromure de 2,3,5-tri-O-benzoyl-3-C-méthyl-α-(et β)-D-ribofuranosyle et de 1,3 g (9,27 mmoles) de 2,4-diméthoxy-pyrimidine dans 75 ml de chlorure de méthylène est maintenu à température ordinaire pendant 5 jours. Une chromatographie en couche mince sur alumine dans le chloroforme-benzène (3:1) montre des zones (développées à la vapeur d'iode) à R_f 0,2 (anomère α du produit), 0,6 (anomère β du produit), 0,8 (pyrimidine n'ayant pas réagi). Le mélange réactionnel est dilué avec 50 ml de chlorure de méthylène, puis extrait avec 3 portions de 30 ml d'acide chlorhydrique à 5 % froid et 30 ml de bicarbonate de potassium à 5 % froid. La solution chlorométhylénique est séchée sur du sulfate de magnésium anhydre et évaporée à sec. Le résidu (2,53 g) est chromatographié sur 50 g d'alumine (lavée à l'acide), l'élution étant faite d'abord au benzène-chloroforme (4:1), puis au benzène-chloroforme (1:4) et finalement au chloroforme. Des fractions contenant l'anomère β sont réunies et concentrées. Le résidu est cristallisé dans le benzène-éther de pétrole (1:1), ce qui donne un total de 1,08 g (45 %) de 1-(2,3,5-tri-O-benzoyl-3-C-méthyl-β-D-ribofuranosyl)-4-méthoxy-2(1H)-pyrimidinone fondant à 84-90°C ; $[\alpha]_D^{25} -76^\circ$ (c, 1 dans $CHCl_3$); $\lambda_{max}^{MeOH} m\mu$ ($\epsilon \times 10^{-3}$) - 230 (43,4), 275 (9,4), 280 (8,6). Les fractions de colonne ultérieures contenant

l'anomère α du produit sont réunies et concentrées. Par cristallisation du résidu (120 mg) on obtient la 1-(2,3,5-tri-O-benzoyl-3-C-méthyl- α -D-ribofuranosyl)-4-méthoxy-2(1H)-pyrimidinone purifiée fondant à 206-209°C; $[\alpha]_D^{20} -180^\circ$ (c, 0,5 dans CHCl_3); $\lambda_{\text{max}}^{\text{MeOH}}$ m μ (E $\times 10^{-3}$) - 229 (38,0), 275 (9,3), 280 (8,6).

Un mélange de 500 mg (0,856 mmoles) de 1-(2,3,5-tri-O-benzoyl-3-C-méthyl- β -D-ribofuranosyl)-4-méthoxy-2(1H)-pyrimidinone dans 7,5 ml de méthanol, préalablement saturé d'ammoniac à 0°C, est agité pendant 16 heures à 100°C en tube scellé. Le contenu du tube est concentré et l'huile résiduelle (1,07 g) est dissous dans 50 ml d'eau. Le mélange aqueux est extrait avec 3 portions de 30 ml d'éther pour enlever la benzamide. La solution aqueuse est évaporée à sec et le produit cristallise. Le solide est dissous dans le méthanol, filtré et concentré. Par refroidissement on obtient 201 mg (92 %) de 3'-C-méthylcytidine fondant à 235-238°C; $[\alpha]_D^{20} +4^\circ$ (c, 0,5 dans H_2O); $\lambda_{\text{max}}^{\text{H}_2\text{O}}$ m μ (E $\times 10^{-3}$) - pH 1 - 212,5 (10,6), 279 (12,9) - pH 7 - 232,5 (8,1), 271 (8,9) - pH 13 - 230 (8,2), 271 (8,9).

De façon analogue on obtient les 3'-O-éthylcytidine, 2'-C-méthylcytidine et 2'-O-éthylcytidine correspondantes lorsqu'au lieu du bromure de 2,3,5-tri-O-benzoyl-3-C-méthyl- α (et β)-ribofuranosyle on utilise comme produit de départ le dérivé 3-C-éthyl, 2-C-méthyl ou 2-C-éthyl approprié.

Un mélange de 50 mg (0,085 mmole) de 1-(2,3,5-tri-O-benzoyl-3-C-méthyl- α -D-ribofuranosyl)-4-méthoxy-2(1H)-pyrimidinone et 3 ml de méthanol, préalablement saturé d'ammoniac à 0°C, est agité pendant 16 heures à 100°C en tube scellé. Le contenu du tube est évaporé à sec et le résidu (50 mg) est dissous dans 4 ml d'eau. La solution aqueuse est extraite avec trois portions de 3 ml d'éther. La couche aqueuse est filtrée jusqu'à obtention d'un résidu solide. Par cristallisation du résidu dans 2,5 ml de méthanol, on obtient environ 20 mg de 1-(3-C-méthyl- α -D-ribofuranosyl)-cytosine fondant à 250-258°C.

De façon analogue on obtient les 1-(2-C-méthyl- α -D-ribofuranosyl)cytosine, 1-(2-C-éthyl- α -D-ribofuranosyl)cytosine et 1-(3-C-éthyl- α -D-ribofuranosyl)cytosine correspondantes lorsque, dans le mode opératoire ci-dessus, on remplace la 1-(2,3,5-tri-O-benzoyl-3-C-méthyl- α -D-ribofuranosyl)-4-méthoxy-2(1H)-pyrimidinone par une quantité équivalente du dérivé 2-C-méthyl, 2-C-éthyl ou 3-C-éthyl approprié.

Exemple 39 -

1-(2,3,5-tri-O-benzoyl-2-C-méthyl- β -D-ribofuranosyl)-5-fluoro-4-méthoxy-2(1H)-pyrimidinone

Une solution de 4,8 g (9,7 mmoles) de chlorure de 2,3,5-tri-O-benzoyl-2-C-méthyl- β -D-ribofuranosyl dans 18 ml de toluène sec est ajoutée à 3,5 g (22,2 mmol) de 2,4-diméthoxy-5-fluoropyrimidine et

- le mélange est chauffé à reflux pendant 96 heures. La solution toluénique est concentrée et le résidu est dissous dans 100 ml d'éther puis extrait avec 3 portions de 50 ml d'acide chlorhydrique 4N, 3 portions de 50 ml de bicarbonate de sodium saturé et finalement avec de l'eau.
- 5 La solution étherée est concentrée et le résidu (6,2 g) est chromatographié sur 150 g de gel de silice dans le benzène-acétate d'éthyle (19:1). Après élution de plusieurs sous-produits (R_f 0,8, 0,7, 0,6, 0,5 et 0,39 - chromatographie en couche mince sur gel de silice dans le benzène-acétate d'éthyle (19:1), on obtient des fractions contenant
- 10 un total de 3,9 g de produit (R_f 0,23 tlc). Par cristallisation dans 5 ml de benzène et 50 ml d'éther, on obtient 3,2 g (55 %) de 1-(2,3,5-tri-O-benzoyl-2-C-méthyl- β -D-ribofuranosyl)-5-fluoro-4-méthoxy-2(1H)-pyrimidinone fondant à 157-159°C ; $[\alpha]_D^{20}$ -14°, $[\alpha]_{478}^{20}$ -14° (c 1, chloroforme) ; $\lambda_{\max}^{\text{EtOH}}$ m μ ($\epsilon \times 10^{-3}$), 229 (49,4), 277 (8,9), 283 (9,0),
- 15 293 inf. (6,4).

Analyse :

Calculé pour $C_{32}H_{27}N_2O_9$: C 63,79 ; H 4,52 ; F 3,15 ; N 4,65

Trouvé : C 63,91 ; H 4,34 ; F 2,80 ; N 4,35.

- En employant le même mode opératoire, mais en remplaçant la
- 20 2,4-diméthoxy-5-fluoropyrimidine par une quantité équivalente de 2,4-diméthoxy-5-trifluorométhylpyrimidine ou de 2,4-diméthoxy-5-méthylpyrimidine, on obtient respectivement la 1-(2,3,5-tri-O-benzoyl-2-C-méthyl- β -D-ribofuranosyl)-5-trifluorométhyl-4-méthoxy-2(1H)-pyrimidinone ou la 1-(2,3,5-tri-O-benzoyl-2-C-méthyl- β -D-ribofuranosyl)-5-méthyl-4-méthoxy-2(1H)-pyrimidinone.
- 25

Exemple 40 -

5-fluoro-1-(2-C-méthyl- β -D-ribofuranosyl)-cytosine [5-fluoro-2'-C-méthylcytidine]

- Une solution de 80 mg (0,13 mmole) de 1-(2,3,5-tri-O-benzoyl-
- 30 2-C-méthyl- β -D-ribofuranosyl)-5-fluoro-4-méthoxy-2(1H)-pyrimidinone dans 7 ml de méthanol, saturé d'ammoniac à 0°C, est chauffée à 100°C en tube scellé pendant 18 heures. La solution est concentrée sous pression réduite et le résidu est dissous dans 10 ml d'eau puis
- 35 extrait avec 3 portions de 5 ml d'éther. La phase aqueuse est concentrée sous pression réduite et le résidu, cristallisé dans 0,2 ml de méthanol plus 0,01 ml d'éther, donne 24 mg (67 %) de 5-fluoro-2'-C-méthylcytidine fondant à 247-249°C ; R_f 0,78 -tlc sur cellulose dans l'eau ; $[\phi]_{400}^{20} + 1.200^\circ$, $[\phi]_{302}^{20} + 15.700^\circ$ (pk), $[\phi]_{281}^{20}$ 0°, $[\phi]_{255}^{20}$ -18.700° (tr), $[\phi]_{242}^{20}$ -16.300° (pk), $[\phi]_{233}^{20}$ -17.700° (tr),
- 40 $[\phi]_{219}^{20}$ 0° ; $\lambda_{\max}^{\text{H}_2\text{O}}$ m μ ($\epsilon \times 10^{-3}$) : pH 1 - 214 (9,7), 292 (11,1) - pH 7 - 2,3 (8,9, 238 (7,7), 282,5 (8,0) - pH 13 - 237 (7,7), 283 (8,1).

Analyse :

Calculé pour $C_{10}H_{14}FN_3O_5$: C 43,63 ; H 5,13 ; N 15,27

Trouvé : C 43,38 ; H 5,25 ; N 14,98.

On obtient la 5-trifluorométhyl-2'-C-méthylcytidine

- 5 correspondante lorsqu'on emploie une quantité équivalente de 1-(2,3,5-tri-O-benzoyl-2-C-méthyl-β-D-ribofuranosyl)-5-trifluorométhyl-4-méthoxy-2(1H)-pyrimidinone au lieu de la 1-(2,3,5-tri-O-benzoyl-2-C-méthyl-β-D-ribofuranosyl)-5-fluoro-4-méthoxy-2(1H)-pyrimidinone.

Exemple 41 -

- 10 5-fluoro-1-(2-C-méthyl-β-D-ribofuranosyl)-uracil-7 5-fluoro-2'-C-méthyluridine

- Une suspension de 602,5 mg (1,0 mmoles) de 1-(2,3,5-tri-O-benzoyl-2-C-méthyl-β-D-ribofuranosyl)-5-fluoro-4-méthoxy-2(1H)-pyrimidinone dans 20 ml de méthanol est traitée avec 160 mg (4,0 mmoles) d'hydroxyde de sodium et 2 ml d'eau. Le mélange est porté à reflux pendant 45 minutes et la solution est concentrée sous pression réduite. Le résidu est dissous dans 20 ml d'eau et on ajoute de petites portions de résine Dowex 50 x 4 (H+) jusqu'à ce que le pH de la solution soit de 4,0. La résine et l'acide benzoïque précipité
 15 sont éliminés et lavés à fond à l'eau. Les filtrats réunis sont extraits avec 6 portions de 25 ml d'éther. La couche aqueuse est concentrée sous pression réduite et le résidu (300 mg) dans 5 ml de méthanol est traité avec 1 ml d'éther. Le solide précipité est séparé et le filtrat est concentré à 0,3 ml et maintenu à 5°C pendant 18 heures. Le solide (107 mg, fondant à 196-205°C) obtenu, recristallisé dans 0,5 ml de méthanol et 0,5 ml d'éther, donne 74 mg (27 %) de 5-fluoro-2'-C-méthyluridine fondant à 205-207°C.

Exemple 42 -5-bromo-2'-méthyluridine

- 30 Une solution de 45,6 mg (0,2 mmoles) de 2'-méthyluridine dans 0,4 ml d'eau est additionnée goutte à goutte d'une solution de brome dans l'eau jusqu'à persistance d'une coloration jaune pâle. On souffle de l'azote à travers la solution pour enlever l'excès de brome et on lyophilise la solution. La 1-(2-méthyl-β-D-ribofuranosyl)-4-
 35 hydroxy-5,6-dibromo-2(1,5,6-H)pyrimidone résiduelle est dissoute dans 1,5 ml d'éthanol. La solution est portée à reflux et de l'acide bromhydrique se dégage. Il se forme un maximum d'absorption dans l'ultra-violet à 282 m pendant la période de chauffage. La solution est concentrée sous pression réduite, l'huile résiduelle est dissoute dans
 40 l'eau et lavée avec 2 portions de 1 ml d'éther. La couche aqueuse est évaporée à sec. Le produit est dissous dans 2 ml d'eau et traité avec 30 mg de noir décolorant. Après séparation du noir, la solution aqueuse incolore est concentrée à sec. Le méthanol est éliminé du résidu (53,5g)

sous pression réduite à plusieurs reprises pour éliminer les dernières traces d'eau. Par trituration du résidu avec de l'éther on obtient la 5-bromo-2'-méthyluridine.

- En opérant comme précédemment, mais en partant de 2'-éthyl-,
 5 3'-méthyl- ou 3'-éthyluridine, on obtient la 2'-éthyl-, 3'-méthyl-
 ou 3'-éthyl-5-bromo-uridine.

Exemple 43 -

2'-C-méthyl-5-méthylaminouridine

- Une solution de 3,9 g (12 mmoles) de 5-bromo-3'-C-méthyl-
 10 uridine dans 40 ml de méthylamine liquide anhydre est chauffée à 80°C
 en tube scellé pendant 18 heures. L'amine est évaporée et le résidu est
 dissous dans l'eau et ajouté à une colonne de 400 ml de Dowex 50W x 4
 (H+). La colonne est lavée à fond avec de l'eau distillée pour enlever
 des produits neutres absorbant l'ultra-violet et le produit est élué
 15 avec de l'hydroxyde d'ammonium 0,5N. Par concentration de l'éluant on
 obtient un résidu de 2'-C-méthyl-5-méthylaminouridine.

- Si, dans le mode opératoire ci-dessus, on remplace la 5-
 bromo-2'-C-méthyluridine par la 5-bromo-2'-C-éthyluridine, la
 5-bromo-3'-C-méthyluridine ou la 5-bromo-3'-C-éthyluridine, on obtient
 20 la 2'-C-éthyl-5-méthylamino-uridine, la 3'-C-méthyl-5-méthylamino-
 uridine ou la 3'-C-éthyl-5-méthylamino-uridine.

- Si, dans le mode opératoire ci-dessus, on remplace la méthyl-
 amine par l'éthylamine, la diméthylamine ou du méthanol saturé à 0°C
 avec de l'ammoniac, on obtient la 2'-C-méthyl-5-éthylamino-uridine,
 25 la 2'-C-méthyl-5-diméthylamino-uridine ou la 2'-C-méthyl-5-amino-
 uridine.

Exemple 44 -

2'-C-méthyl-5-trifluorométhyluridine

- Une solution de 1 g de 1-(2,3,5-tri-O-benzoyl-2-C-méthyl-β-
 30 D-ribofuranosyl)-4-méthoxy-5-trifluorométhyl-2(1H)-pyrimidinone comme
 préparée dans l'exemple 39, dans 50 ml de méthanol contenant 1 ml d'aci-
 de chlorhydrique concentré est maintenu à 25°C pendant plusieurs jours.
 La solution est concentrée à sec et on obtient un résidu contenant la
 2'-C-méthyl-5-trifluorométhyluridine.

- En remplaçant la 1-(2,3,5-tri-O-benzoyl-2-C-méthyl-β-D-
 ribofuranosyl)-4-méthoxy-5-trifluorométhyl-2(1H)-pyrimidinone utilisée
 ci-dessus par la 1-(2,3,5-tri-O-benzoyl-3-C-méthyl-β-D-ribofuranosyl)-
 4-méthoxy-5-trifluorométhyl-2(1H)-pyrimidinone, la 1-(2,3,5-tri-O-
 benzoyl-2-C-éthyl-β-D-ribofuranosyl)-4-méthoxy-5-trifluorométhyl-2(1H)-
 40 pyrimidinone ou la 1-(2,3,5-tri-O-benzoyl-3-C-éthyl-β-D-ribofuranosyl)-
 4-méthoxy-5-trifluorométhyl-2(1H)-pyrimidinone, on obtient la 3'-C-
 méthyl-5-trifluorométhyluridine, la 2'-C-éthyl-5-trifluorométhyl-
 uridine ou la 3'-C-éthyl-5-trifluorométhyluridine.

Exemple 45 -1-(2,3,5-tri-O-benzoyl-2-C-méthyl-β-D-ribofuranosyl)-5-fluoro-4-méthoxy-2(1H)-pyrimidinone

- Une solution de 4,8 g (9,7 mmoles) de chlorure de 2,3,5-tri-O-benzoyl-2-C-méthyl-β-D-ribofuranosyle dans 18 ml de toluène sec est ajoutée à 3,5 g (22,2 mmoles) de 2,4-diméthoxy-5-fluoropyrimidine et le mélange est chauffé à reflux pendant 96 heures. La solution toluénique est concentrée et le résidu est dissous dans 100 ml d'éther et extrait avec 3 portions de 50 ml d'acide chlorhydrique 4N et 3 portions de 50 ml de bicarbonate de sodium saturé et finalement avec de l'eau. La solution étherée est concentrée et le résidu (6,2 g) est chromatographié sur 150 g de gel de silice dans le benzène-acétate d'éthyle (19:1). Après élution de plusieurs sous-produits (R_f 0,8, 0,7, 0,6, 0,5 et 0,39 - chromatographie en couche mince sur gel de silice dans le benzène-acétate d'éthyle, 19:1), on obtient des fractions contenant au total 3,9 g de produit (R_f 0,23-tlc). Par cristallisation dans 5 ml de benzène et 50 ml d'éther, on obtient 3,2 g (55 %) de 1-(2,3,5-tri-O-benzoyl-2-C-méthyl-β-D-ribofuranosyl)-5-fluoro-4-méthoxy-2(1H)-pyrimidinone fondant à 157-159°C ; $[\alpha]_D^{20}$ -14°, $[\alpha]_{578}^{20}$ -14° (c 1, chloroforme) ; $\lambda_{\max}^{\text{EtOH}}$ mμ ($\epsilon \times 10^{-3}$), 229 (49,4), 277 (8,9), 283 (9,0), 293 infl. (6,4).

Analyse :

Calculé pour $C_{32}H_{27}FNO_9$: C 63,79 ; H 4,52 ; F 3,15 ; N 4,65

Trouvé : C 63,91 ; H 4,34 ; F 2,80 ; N 4,35.

- Si on remplace le chlorure de 2,3,5-tri-O-benzoyl-2-C-méthyl-β-D-ribofuranosyle utilisé ci-dessus par le chlorure de 2,3,5-tri-O-benzoyl-2-C-éthyl-β-D-ribofuranosyle, le chlorure de 2,3,5-tri-O-benzoyl-3-C-méthyl-β-D-ribofuranosyle ou le chlorure de 2,3,5-tri-O-benzoyl-3-C-éthyl-β-D-ribofuranosyle, on obtient respectivement la 1-(2,3,5-tri-O-benzoyl-2-C-éthyl-β-D-ribofuranosyl)-5-fluoro-4-méthoxy-2(1H)-pyrimidinone, la 1-(2,3,5-tri-O-benzoyl-3-C-méthyl-β-D-ribofuranosyl)-5-fluoro-4-méthoxy-2(1H)-pyrimidinone ou la 1-(2,3,5-tri-O-benzoyl-3-C-éthyl-β-D-ribofuranosyl)-5-fluoro-4-méthoxy-2(1H)-pyrimidinone.

35 Exemple 46 -5-fluoro-1-(2-C-méthyl-β-D-ribofuranosyl)cytosine [5-fluoro-2'-C-méthylcytidine]

- Une solution de 80 mg (0,13 mmole) de 1-(2,3,5-tri-O-benzoyl-2-C-méthyl-β-D-ribofuranosyl)-5-fluoro-4-méthoxy-2(1H)-pyrimidinone dans 7 ml de méthanol saturé d'ammoniac à 0°C est chauffée en tube scellé à 100°C pendant 18 heures. La solution est concentrée sous pression réduite et le résidu est dissous dans 10 ml d'eau, puis extrait avec 3 portions de 5 ml d'éther. La phase aqueuse est concentrée sous